

Fibred $\mathcal{F}$ -Algebra

Aleks Kleyn

ABSTRACT. The concept of $\mathcal{F}$ -algebra and its representation can be extended to an arbitrary bundle. We define operations of fibred $\mathcal{F}$ -algebra in fiber. The paper presents the representation theory of of fibred $\mathcal{F}$ -algebra as well as a comparison of representation of $\mathcal{F}$ -algebra and of representation of fibred $\mathcal{F}$ -algebra.

Theory of representation of algebra has long and extensive history. During XX century representation theory became an integral part of different applications. Transition from algebra to algebra bundle opens new opportunities. I have ventured to write this paper where I want to discover new properties of algebra bundle.

Since a cut of the bundle may be not defined on the whole bundle, all statements assume a specific domain. Such statements are modelled on statement about existence of trivial tangent bundle on manifold.

However there exists other group of statements restricting the domain of fibred $\mathcal{F}$ -algebra. I give appropriate examples in the text. The explanation follows.

We suppose that transormation of fiber caused by parallel transfer is one-to-one map. Continuously moving along base, we continuously move from one fiber to other. Assumption that map between fibers is homeomorphism waranties continuous deformation of fiber.

If we choose the point in fiber, then the trajectory of its movement when its projection moves along base is parallel to base. In differential geometry such lines are called horisontal. We also will use this definition.

Since we assume that there is structure of $\mathcal{F}$ -algebra on fiber, then we expect that corresponding map is isomorphism of $\mathcal{F}$ -algebra. Continuity allows to save considered structures when we use parallel transfer, it allows to make smooth transfer from fiber to fiber.

This picture works well in the small. When we consider finite intervals on base, continuity becomes responsible for impossibility to extend the structure of $\mathcal{F}$ -algebra as far as we please. For instance, there may apear points where homeomorphism is broken. It happens when horizontal lines have intersection or topological propertes of fiber change. Corresponding fiber is called degenerate, and its projection is called point of degeneracy.

It is not easy to say how many points of degeneracy there are. It is clear by intuition that this set is small in comparison with the base. However, this set may prove to be essential for the study of geometry of bundles or physical processes associated with this bundle.

The problem to extend the solution of differential equation is one of such events in the theory of differential equations. At the same time, there exist two types of

Key words and phrases. differential geometry, bundle, algebra.
Aleks_Kleyn@MailAPS.org.

solution of differential equation. Regular solution belongs to family of functions dependent on arbitrary constants. Singular solution is envelope of family of regular solutions.

The problem of describing fibers of bundle, regardless whether they are degenerate or not, has an interesting solution. Any path on the base of bundle is map of interval $I = [0, 1]$ into base of bundle. Let us assume that fibers of bundle are not homeomorphic, but homotopic.

The holonomy group of bundle also has constraints for structure of fibered $\mathcal{F}$ -algebra $\mathcal{A} = p[A]$. It is natural to assume that using parallel transfer we have homomorphism of $\mathcal{F}$ -algebra from one fiber into another. Therefore, we assume that transformation caused by parallel transfer along loop is homomorphism of $\mathcal{F}$ -algebra. Thus, everything is fine when the holonomy group of bundle $\mathcal{A}$ is subgroup of group of homomorphisms of $\mathcal{F}$ -algebra A . In this case fibered $\mathcal{F}$ -algebra $\mathcal{A}$ is called holonomic. Otherwise fibered $\mathcal{F}$ -algebra $\mathcal{A}$ is called anholonomic.

From theory of vector bundles we know that there exist fibered $\mathcal{F}$ -algebra which is not holonomic. At the same time, the theory of vector bundles has answer how we can work with anholonomic fibered $\mathcal{F}$ -algebra.

We apply this remark also to the theory of representations of fibered $\mathcal{F}$ -algebra.

A new design is illustrated through the use of corresponding diagrams.

Where it is possible I use the same notation for operations and relations as we use them in the set theory. It does not bring to ambiguity because we use different notation for set and bundle. I use the same letter in different alphabets to denote bundle and fiber.

We assume that projection of bundle, section and fibered map are smooth maps.

1. BUNDLE

Let M be a manifold and

$$(1.1) \quad p[E] : \mathcal{E} \rightarrow M$$

be a bundle over M with fiber E .¹ The symbol $p[E]$ means that E is a typical fiber of the bundle. Set $\mathcal{E}$ is domain of map $p[E]$. Set M is range of map $p[E]$. We identify the smooth map $p[E]$ and the bundle (1.1). Denote by $\Gamma(p[E])$ the set of sections of bundle $p[E]$.

Cartesian power A of set B is the set B^A of mappings $f : A \rightarrow B$ ([5], page 5). Let us consider subsets of B^A of the form

$$W_{K,U} = \{f : A \rightarrow B | f(K) \subset U\}$$

where K is compact subset of space A , U is open subset of space B . Sets $W_{K,U}$ form base of topology on space B^A . This topology is called **compact-open topology**. Cartesian power A of set B equipped by compact-open topology is called **mapping space** ([6], page 213).

According to [6], . 214, given spaces A, B, C, D and mappings $f : A \rightarrow C$, $g : D \rightarrow B$ we define morphism of mapping spaces

$$g^f : D^C \rightarrow B^A$$

¹Since I have deal with different bundles I follow next agreement. I use the same letter in different alphabets for notation of bundle and fiber.

by law

$$g^f(h) = fhg \quad h : C \rightarrow D \quad g^f(h) : A \rightarrow B$$

Thus, we can represent the morphism of mapping spaces using diagram

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & C \\ g^f(h) \downarrow & & \downarrow h \\ B & \xleftarrow{g} & D \end{array}$$

Set $\Gamma(\mathcal{E})$ is subset of set $\mathcal{E}^M$. This is why for set of sections we can use definitions established for mapping set. This is why for set of sections we can use methods defined for mapping space. We define sets $W_{K,U}$ by law

$$W_{K,U} = \{f \in \Gamma(\mathcal{E}) | f(K) \subset U\}$$

where K is compact subset of space M , U is open subset of space $\mathcal{E}$.

Remark 1.1. I use arrow $- - \triangleright$ to represent projection of bundle on diagram. $\square$

Remark 1.2. I use arrow $\cdots \triangleright$ to represent section of bundle on diagram. $\square$

Let f be a fibred map from $\mathcal{E}$ to $\mathcal{E}'$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{f} & \mathcal{E}' \\ | & & | \\ | p[E] & & | p'[E'] \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ M & \xrightarrow{F} & M' \end{array}$$

The map F is the **base of map** f . The map f is the **lift of map** F .

Suppose map F is bijection. Then the map f defines morphism $f^{F^{-1}}$ of spaces of sections $\Gamma(p[E])$ to $\Gamma(p'[E'])$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{f} & \mathcal{E}' \\ \vdots \uparrow & \xrightarrow{f^{F^{-1}}} & \vdots \uparrow \\ u & \xrightarrow{\quad} & u' \\ \vdots \downarrow & & \vdots \downarrow \\ M & \xrightarrow{F} & M' \end{array} \quad u' = f^{F^{-1}}(u) = fuF^{-1}$$

It is enough to prove continuity of F^{-1} to prove continuity of u' . However this is evident, because F is continuous bijection.

Since $F = \text{id}$, then $\text{id}^{-1} = \text{id}$. In this case we use notation f^{id} for morphism of spaces of sections. It is evident, that

$$f^{\text{id}}(u) = fu$$

2. CARTESIAN PRODUCT OF BUNDLES

Remark 2.1. Let $A_1 \times \dots \times A_n$ be Cartesian product of sets $A_1, \dots, A_n$

$$\begin{array}{ccc} & A_1 \times \dots \times A_n & \\ p_1 \swarrow & \downarrow & \searrow p_n \\ A_1 & \dots & A_n \end{array}$$

According to [1] we can represent the map

$$f : A \rightarrow A_1 \times \dots \times A_n$$

as tuple $f = (f_1, \dots, f_n)$ where $f_i = f p_i$

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & A_1 \times \dots \times A_n & & \\ & \searrow f_1 & \swarrow p_1 & \downarrow & \searrow p_n \\ & A_1 & & \dots & A_n \\ & & & \nearrow f_n & \end{array}$$

□

Let $p_i[E_i] : \mathcal{E}_i \dashrightarrow M_i$, $i = 1, \dots, n$ be the set of bundles. For any i let $\{U_{i\alpha_i}\}$ be a cover of M_i such that for any $U_{i\alpha_i}$ there exists a local chart $\varphi_{i\alpha_i}$ of the bundle $p_i[E_i]$

$$\begin{array}{ccc} U_{i\alpha_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\alpha_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}} \\ & \searrow & \swarrow \\ & U_{i\alpha_i} & \end{array}$$

Definition 2.2. For any point $x_i \in M_i$ there exist open set $U_{i\alpha_i}$, $i = 1, \dots, n$ such, that $x_i \in U_{i\alpha_i}$. By (x_i, a_i) , $x_i \in U_{i\alpha_i}$, $a_i \in E_i$ denote a point of set $\mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}}$. For tuple $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ we introduce trivial bundle

$$e_\alpha : \mathcal{E}_\alpha \dashrightarrow U_\alpha = U_{1\alpha_1} \times \dots \times U_{n\alpha_n}$$

with $\mathcal{E}_\alpha$ consisting of tuples $(x_1, \dots, x_n, a_1, \dots, a_n)$. Cartesian product $\prod_{i=1}^n E_i$ is a fiber of this bundle. Cartesian product $\prod_{i=1}^n U_{i\alpha_i}$ is a base of this bundle. □

Continuity of projection of this bundle follows from Corollary 1 of Proposition 1 ([8], page 44).

To define a bundle over manifold $\prod_{i=1}^n M_i$, we need to define gluing functions. Let $\psi_{i\alpha_i\beta_i}$ be gluing functions of bundle $p_i[E_i]$

$$\begin{array}{ccc} U_{i\alpha_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\alpha_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}} \\ \downarrow (p_i, \bar{\psi}_{i\alpha_i\beta_i}) & & \downarrow \psi_{i\alpha_i\beta_i} \\ U_{i\beta_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\beta_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\beta_i}} \end{array}$$

Suppose $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. Then we define gluing function using diagram

$$\begin{array}{ccc} U_\alpha \times E_1 \times \dots \times E_n & \xrightarrow{id} & \mathcal{E}|_{U_\alpha} \\ \downarrow (p, \bar{\psi}_{1\alpha_1\beta_1}, \dots, \bar{\psi}_{n\alpha_n\beta_n}) & & \downarrow \psi_{\alpha\beta} \\ U_\beta \times E_1 \times \dots \times E_n & \xrightarrow{id} & \mathcal{E}|_{U_\beta} \end{array}$$

Bundle

$$p_1[E_1] \times \dots \times p_n[E_n] = \prod_{i=1}^n p_i[E_i] = p[\prod_{i=1}^n E_i] : \mathcal{E} \dashrightarrow M$$

is called **Cartesian product of bundles** $p_i[E_i]$. We also speak that the total space $\mathcal{E}$ is **Cartesian product of total spaces** $\mathcal{E}_i$ and use notation

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_n = \prod_{i=1}^n \mathcal{E}_i$$

Remark 2.3. According to remark 2.1 we can represent a section of Cartesian product of bundles $p_1[E_1] \times \dots \times p_n[E_n]$ as tuple of sections $a = (a_1, \dots, a_n)$. $\square$

We will use following diagrams to represent Cartesian product of bundles

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{E} & & \mathcal{E} \\ & \swarrow & & \searrow & \downarrow \\ p_1 & & & & p_n \\ & \swarrow & \times \dots \times & \searrow & \downarrow \\ & M_1 & \dots & M_n & M_i \end{array}$$

On the diagram, the arrows connected by either symbol $\times$ or $\prod$ denote the arrow corresponding to projection of bundle $\mathcal{E}$. The notation is intended to show the structure of map.

Product of any two fibers is defined in the Cartesian product of bundles. As we see below, such bundle reproduces the structure of the base. This substantially restricts the application of Cartesian product of bundles.

3. REDUCED CARTESIAN PRODUCT OF BUNDLES

Since bundles are defined over common base we can change definition of Cartesian product of bundles.

Let $p_i[E_i] : \mathcal{E}_i \dashrightarrow M$, $i = 1, \dots, n$ be the set of bundles over manifold M . For any i let $\{U_{i\alpha_i}\}$ be a cover of M such that for any $U_{i\alpha_i}$ there exists a local chart $\varphi_{i\alpha_i}$ of the bundle $p_i[E_i]$

$$\begin{array}{ccc} U_{i\alpha_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\alpha_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}} \\ & \searrow & \swarrow \\ & U_{i\alpha_i} & \end{array}$$

Definition 3.1. For any point $x \in M$ there exist open sets $U_{i\alpha_i}$, $i = 1, \dots, n$ such, that $x \in U_{i\alpha_i}$. By (x, a_i) , $x \in U_{i\alpha_i}$, $a_i \in E_i$ denote a point of set $\mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}}$. For tuple $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ we introduce trivial bundle $p_\alpha : \mathcal{E}_\alpha \dashrightarrow U_\alpha = \bigcap_{i=1}^n U_{i\alpha_i}$ with $\mathcal{E}_\alpha$ consisting of tuples $(x, a_1, \dots, a_n)$. Cartesian product $\prod_{i=1}^n E_i$ is a fiber of this bundle. The set U_α is a base of this bundle. $\square$

According to definition, we can represent the bundle over set U_α as

$$U_\alpha \times \prod_{i=1}^n E_i$$

According to [8], page 44, given U belongs to the base of topology of space U_α , then $U \times \prod_{i=1}^n E_i$ belongs to the base of topology of space $\mathcal{E}_\alpha$. We can represent

set U as $U = \cup_{i \in I} U_i$, where U_i belong to the base of topology of space M , if U is open set of space M . Accordingly, the set

$$p_\alpha^{-1}(U) = U \times \prod_{i=1}^n E_i$$

can be represented as

$$p_\alpha^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} (U_i \times \prod_{i=1}^n E_i)$$

and it is an open set. Therefore, projection p_α is continuous mapping.

To define a bundle over manifold M , we need to define gluing functions. Let $\psi_{i\alpha_i\beta_i}$ be gluing functions of bundle $p_i[E_i]$

$$\begin{array}{ccc} U_{i\alpha_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\alpha_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}} \\ (p_i, \bar{\psi}_{i\alpha_i\beta_i}) \downarrow & & \downarrow \psi_{i\alpha_i\beta_i} \\ U_{i\beta_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\beta_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\beta_i}} \end{array}$$

Suppose $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. Then we define gluing function using diagram

$$\begin{array}{ccc} U_\alpha \times E_1 \times \dots \times E_n & \xrightarrow{id} & \mathcal{E}|_{U_\alpha} \\ (p, \bar{\psi}_{1\alpha_1\beta_1}, \dots, \bar{\psi}_{n\alpha_n\beta_n}) \downarrow & & \downarrow \psi_{\alpha\beta} \\ U_\beta \times E_1 \times \dots \times E_n & \xrightarrow{id} & \mathcal{E}|_{U_\beta} \end{array}$$

Bundle

$$p_1[E_1] \odot \dots \odot p_n[E_n] = \bigodot_{i=1}^n p_i[E_i] = p[\prod_{i=1}^n E_i] : \mathcal{E} \dashrightarrow M$$

is called **reduced Cartesian product of bundles** $p_i[E_i]$. We also speak that the total space $\mathcal{E}$ is **reduced Cartesian product of total spaces** $\mathcal{E}_i$ and use notation

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \odot \dots \odot \mathcal{E}_n = \bigodot_{i=1}^n \mathcal{E}_i$$

Remark 3.2. According to remark 2.1 we can represent a section of reduced Cartesian product of bundles $p_1[E_1] \odot \dots \odot p_n[E_n]$ as tuple of sections $a = (a_1, \dots, a_n)$. $\square$

We will use following diagrams to represent reduced Cartesian product of bundles

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{E} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ p_1 & \bigodot \dots \bigodot & p_n \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & M & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & \mathcal{E} & \\ & \downarrow & \\ & \bigodot_{i=1}^n p_i & \\ & \downarrow & \\ & M & \end{array}$$

On the diagram, the arrows connected by symbol $\odot$ denote the arrow corresponding to projection of bundle $\mathcal{E}$. The notation is intended to show the structure of map.

In reduced Cartesian product we define product of fibers over selected point. This makes the structure of product more rich.

Definition 3.3. For $n \geq 0$ we define **Cartesian power of bundle**²

$$\begin{cases} p[E]^0 = id : M \dashrightarrow M & n = 0 \\ p[E]^n = \odot_{i=1}^n p[E] : \mathcal{E}^n \dashrightarrow M & n > 0 \end{cases}$$

□

4. FIBERED $\mathcal{F}$ -ALGEBRA


Definition 4.1. An n -ary **operation on bundle** $p[E]$ is a fibred map

$$f : \mathcal{E}^n \rightarrow \mathcal{E}$$

n is **arity of operation**. 0-arity operation is a section of $\mathcal{E}$.

□

We can represent the operation using the diagram



Theorem 4.2. Let U be an open set of base M . Suppose there exist trivialization of bundle $p[E]$ over U . Let $x \in M$. Let ω be n -ary operation on bundle $p[E]$ and

$$\omega(p_1, \dots, p_n) = p$$

in the fiber E_x . Then there exist open sets $V \subseteq U$, $W \subseteq E$, $W_1 \subseteq E_1$, ..., $W_n \subseteq E_n$ such, that $x \in V$, $p \in W$, $p_1 \in W_1$, ..., $p_n \in W_n$, and for any $x' \in V$, $p' \in W \cap \omega V$ there exist $p'_1 \in W_1$, ..., $p'_n \in W_n$ such, that

$$\omega(p'_1, \dots, p'_n) = p'$$

in the fiber $E_{x'}$.

Proof. According to [8], page 44, since V belongs to the base of topology of space U and W belongs to the base of topology of space E , then set $V \times W$ belongs the base of topology of space $\mathcal{E}$. Similarly, since V belongs to the base of topology of space U and $W_1, \dots, W_n$ belong to the base of topology of space E , set $V \times W_1 \times \dots \times W_n$ belongs the base of topology of space $\mathcal{E}^n$.

Since mapping ω is continuous, then for an open set $V \times W$ there exists an open set $S \subseteq \mathcal{E}^n$ such, that $\omega S \subseteq V \times W$. Suppose $x' \in V$. Let $(x', p') \in \omega S$ be an arbitrary point. Then there exist such $p'_1 \in E_{x'}$, ..., $p'_n \in E_{x'}$, that

$$\omega(p'_1, \dots, p'_n) = p'$$

in fiber $E_{x'}$. According to this there exist sets R, R' from base of topology of space U , and sets $T_1, \dots, T_n, T'_1, \dots, T'_n$ from base of topology of space E , such that $x \in R$, $x' \in R'$, $p_1 \in T_1$, $p'_1 \in T'_1$, ..., $p_n \in T_n$, $p'_n \in T'_n$, $R \times T_1 \times \dots \times T_n \subseteq S$, $R' \times T'_1 \times \dots \times T'_n \subseteq S$. We proved the theorem since $W_1 = T_1 \cup T'_1$, ..., $W_n = T_n \cup T'_n$ are open sets. □

²Since I use definition of Cartesian power of bundle only in frame of reduced Cartesian product, I do not use respective adjective for power. I use this remark for all following definitions related to Cartesian power of bundle.

Theorem 4.2 tells about continuity of operation ω , however this theorem tells nothing regarding sets $W_1, \dots, W_n$. In particular, it is possible that these sets are not connected.

We suppose $W = \{p\}$, $W_1 = \{p_1\}$, ..., $W_n = \{p_n\}$, if topology on fiber A is discrete. This leads one to assume that in the neighborhood V the operation does not depend on a fiber. We call the operation ω locally constant. However, it is possible that a condition of constancy is broken on bundle in general. Thus the covering space $R \rightarrow S^1$ of the circle S^1 defined by $p(t) = (\sin t, \cos t)$ for any $t \in R$ is bundle over circle with fiber of group of integers.

Let us consider the alternative point of view on the continuity of operation ω to get a better understanding of role of continuity. Let us consider the continuity of operation ω to better see what does it mean. We need to consider sections, if we want to show that infinitesimal change of operand when moving along base causes infinitesimal change of operation. This change is legal, because we defined operation on bundle in fiber.

Theorem 4.3. *An n -ary operation on bundle maps sections into section.*

Proof. Suppose $f_1, \dots, f_n$ are sections and we define map

$$(4.1) \quad f = \omega^{\text{id}}(f_1, \dots, f_n) : M \rightarrow \mathcal{E}$$

as

$$(4.2) \quad f(x) = \omega(f_1(x), \dots, f_n(x))$$

Let $x \in M$ and $u = f(x)$. Let U be a neighborhood of the point u in the range of the map f .

Since ω is smooth map, then according to [8], page 44, for any i , $1 \leq i \leq n$ the set U_i is defined in the range of section f_i such, that $\prod_{i=1}^n U_i$ is open in the range of section $(f_1, \dots, f_n)$ of the bundle $\mathcal{E}^n$ and


$$\omega\left(\prod_{i=1}^n U_i\right) \subseteq U$$

Let $u' \in U$. Since f is a map, then there exist $x' \in M$ such that $f(x') = u'$. From equation (4.2) it follows that there exist $u'_i \in U_i$, $p(u'_i) = x'$ such, that $\omega(u'_1, \dots, u'_n) = u'$. Since f_i is a section, then there exist a set $V_i \subseteq M$ such, that $f_i(V_i) \subseteq U_i$ and $x \in V_i$, $x' \in V_i$. Therefore, the set

$$V = \cap_{i=1}^n V_i$$

is not empty, it is open in M and $x \in V$, $x' \in V$. Thus the map f is smooth and f is the section. $\square$

We can represent the operation using the diagram



Theorem 4.4. ω^{id} is continuous on $\Gamma(\mathcal{E})$.

Proof. Let us consider a set $W_{K,U}$, where K is compact set of space M , U is open set of space $\mathcal{E}$. We can represent set U as $V \times E$, where V is open set of space M , $K \subset V$. $\omega^{-1}(V \times E) = V \times E^n$ is open set. Therefore,

$$(4.3) \quad (\omega^{\text{id}})^{-1}W_{K,V \times E} = W_{K,V \times E^n}$$

From (4.3) continuity of ω^{id} follows. $\square$

Definition 4.5. Let A be $\mathcal{F}$ -algebra ([2]). We can extend $\mathcal{F}$ -algebraic structure from fiber A to bundle $p[A] : \mathcal{A} \rightarrow M$. If operation ω is defined on $\mathcal{F}$ -algebra A

$$a = \omega(a_1, \dots, a_n)$$

then operation ω is defined on bundle

$$a(x) = \omega(a_1, \dots, a_n)(x) = \omega(a_1(x), \dots, a_n(x))$$

We say that $p[A]$ is a **fibred $\mathcal{F}$ -algebra**. $\square$

Depending on the structure we talk for instance about **fibred group**, **fibred ring**, or **vector bundle**.

Main properties of $\mathcal{F}$ -algebra hold for fibred $\mathcal{F}$ -algebra as well. Proving appropriate theorems we can refer on this statement. However in certain cases the proof itself may be of deep interest, allowing a better view of the structure of the fibred $\mathcal{F}$ -algebra. However properties of $\mathcal{F}$ -algebra on the set of sections are different from properties of $\mathcal{F}$ -algebra in fiber. For instance, if the product in fiber has inverse element, it does not mean that the product of sections has inverse element. Therefore, fibred continuous field generates ring on the set of sections. This is the advantage when we consider fibred algebra. I want also to stress that the operation on bundle is not defined for elements from different fibers.

Let transition functions $g_{\epsilon\delta}$ determine bundle $\mathcal{B}$ over base N . Let us consider maps $V_\epsilon \in N$ and $V_\delta \in N$, $V_\epsilon \cap V_\delta \neq \emptyset$. Point $q \in \mathcal{B}$ has representation (y, q_ϵ) in map V_ϵ and representation (y, q_δ) in map V_δ . Therefore,

$$p_\alpha = f_{\alpha\beta}(p_\beta)$$

$$q_\epsilon = g_{\epsilon\delta}(q_\delta)$$

When we move from map U_α to map U_β and from map V_ϵ to map V_δ , representation of correspondence changes according to the law

$$(x, y, p_\alpha, q_\epsilon) = (x, y, f_{\alpha\beta}(p_\beta), g_{\epsilon\delta}(q_\delta))$$

This is consistent with the transformation when we move from map $U_\alpha \times V_\epsilon$ to map $U_\beta \times V_\delta$ in the bundle $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$.

Theorem 4.6. Let transition functions $f_{\alpha\beta}$ determine fibred $\mathcal{F}$ -algebra $p[A] : \mathcal{A} \rightarrow M$ over base M . Then transition functions $f_{\alpha\beta}$ are homomorphisms of $\mathcal{F}$ -algebra A .

Proof. Let $U_\alpha \in M$ and $U_\beta \in M$, $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ be neighborhoods where fibred $\mathcal{F}$ -algebra $p[A]$ is trivial. Let

$$(4.4) \quad a_\beta = f_{\beta\alpha}(a_\alpha)$$

be map from bundle $p[A]|_{U_\alpha}$ into bundle $p[A]|_{U_\beta}$. Let ω be n -ary operation and points $e_1, \dots, e_n$ belong to fiber A_x , $x \in U_1 \cap U_2$. Suppose

$$(4.5) \quad e = \omega(e_1, \dots, e_n)$$

We represent point $e \in p[A]|_{U_\alpha}$ as (x, e_α) and point $e_i p[A]|_{U_\alpha}$ as $(x, e_{i\alpha})$. We represent point $e \in p[A]|_{U_\beta}$ as (x, e_β) and point $e_i \in p[A]|_{U_\beta}$ as $(x, e_{i\beta})$. According to (4.4)

$$(4.6) \quad e_\beta = f_{\beta\alpha}(e_\alpha)$$

$$(4.7) \quad e_{i\beta} = f_{\beta\alpha}(e_{i\alpha})$$

According to (4.5), the operation in the bundle A_x over neighborhood U_β is

$$(4.8) \quad e_\beta = \omega(e_{1\beta}, \dots, e_{n\beta})$$

Substituting (4.6), (4.7) into (4.8) we get

$$f_{\beta\alpha}(e_\alpha) = \omega(f_{\beta\alpha}(e_{1\alpha}), \dots, f_{\beta\alpha}(e_{n\alpha}))$$

This proves that $f_{\beta\alpha}$ is homomorphism of $\mathcal{F}$ -algebra. $\square$

Definition 4.7. Let $p[A] : \mathcal{A} - \rightarrow M$ and $p'[A'] : \mathcal{A}' - \rightarrow M'$ be two fibered $\mathcal{F}$ -algebras. Bundle map

$$f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$$

is called **homomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebra** if respective fiber map

$$f_x : A_x \rightarrow A'_x$$

is homomorphism of $\mathcal{F}$ -algebra A . $\square$

Definition 4.8. Let $p[A] : \mathcal{A} - \rightarrow M$ and $p'[A'] : \mathcal{A}' - \rightarrow M'$ be two fibered $\mathcal{F}$ -algebras. Homomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebras f is called **isomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebras** if respective fiber map

$$f_x : A_x \rightarrow A'_x$$

is isomorphism of $\mathcal{F}$ -algebra A . $\square$

Definition 4.9. Let $p[A] : \mathcal{A} - \rightarrow M$ be an $\mathcal{F}$ -fibered F-algebra and A' be $\mathcal{F}$ -subalgebra of the $\mathcal{F}$ -algebra A . An fibered $\mathcal{F}$ -algebra $p[A'] : \mathcal{A}' - \rightarrow M$ is a **fibered $\mathcal{F}$ -subalgebra** of the fibered $\mathcal{F}$ -algebra $p[A]$ if homomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebras $\mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}$ is fiber embedding. $\square$

The homomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebra is essential part of this definition. We can break continuity, if we just limit ourselves to the fact of the existence of $\mathcal{F}$ -subalgebra in each fiber.

We defined an operation based reduced Cartesian product of bundles. Suppose we defined an operation based Cartesian product of bundles. Then the operation is defined for any elements of the bundle. However, since $p(a_i) = p(b_i)$, $i = 1, \dots, n$, then $p(\omega(a_1, \dots, a_n)) = p(\omega(b_1, \dots, b_n))$. Therefore, the operation is defined between fibers. We can map this operation to base using projection. This structure is not different from quotient $\mathcal{F}$ -algebra and does not create new element in bundle theory. The same time mapping between different maps of bundle and opportunity to define an operation over sections create problems for this structure.

5. REPRESENTATION OF FIBERED $\mathcal{F}$ -ALGEBRA

Definition 5.1. We call the fibered map

$$t : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$$

transformation of bundle, if respective fiber map

$$t_x : E_x \rightarrow E_x$$

is transformation of a fiber. $\square$

Theorem 5.2. *Let U be open set of base M such that there exists a local chart of the bundle $p[E]$. Let t be transformation of bundle $p[E]$. Let $x \in M$ and $p' = t_x(p)$ in fiber E_x . Then for an open set $V \subseteq M$, $x \in V$ and for an open set $W' \subseteq E$, $p' \in W'$ there exists an open set $W \subseteq E$ such that if $x_1 \in V$, $p_1 \in W$, then $p'_1 = t_{x_1}(p_1) \in W$.*

Proof. According to [8], page 44, sets $V \times W$, where V forms base of topology of space U and W forms base of topology of space E , form base of topology of space $\mathcal{E}$.

Since map t is continuous, then for open set $V \times W'$ there exists open set $V \times W$ such, that $t(V \times W) \subseteq V \times W'$. This is the statement of theorem. $\square$

Theorem 5.3. *Transformation of bundle $p[E]$ maps section into section.*

Proof. We define the image of section s over transformation t using commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{t} & \mathcal{E} \\ & \searrow s & \nearrow s' \\ & M & \end{array}$$

Continuity of map s' follows from theorem 5.2. $\square$

Definition 5.4. Transformation of bundle is **left-side transformation** or **$T\star$ -transformation of bundle** if it acts from left

$$u' = tu$$

We denote ${}^*\mathcal{E}$ or ${}^*p[E]$ or the set of nonsingular $T\star$ -transformations of bundle $p[E]$. $\square$

Definition 5.5. Transformations is **right-side transformations** or **$\star T$ -transformation of bundle** if it acts from right

$$u' = ut$$

We denote $\mathcal{E}^*$ or $p[A]^*$ the set of nonsingular $\star T$ -transformations of bundle $p[E]$. $\square$

We denote e identical transformation of bundle.

Since we define $T\star$ -transformation of bundle by fiber, then set ${}^*p[E]$ is bundle isomorphic to the bundle $p[{}^*E]$.

Definition 5.6. Suppose we defined the structure of fibered $\mathcal{F}$ -algebra on the set ${}^*p[A]$ ([2]). Let $p[B]$ be fibered $\mathcal{F}$ -algebra. We call homomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebras

$$(5.1) \quad f : p[B] \rightarrow {}^*p[A]$$

left-side representation or **$T\star$ -representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra $p[B]$** . $\square$

Definition 5.7. Suppose we defined the structure of fibered $\mathcal{F}$ -algebra on the set $p[A]^\star$ ([2]). Let $p[B]$ be fibered $\mathcal{F}$ -algebra. We call homomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebras

$$f : p[B] \rightarrow p[A]^\star$$


right-side representation or **$\star T$ -representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra $p[B]$.** □

We extend to bundle representation theory convention described in remark [3]-2.2.14. We can write duality principle in the following form


Theorem 5.8 (duality principle). *Any statement which holds for $T\star$ -representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra $p[A]$ holds also for $\star T$ -representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra $p[A]$.*

There are two ways to define a $T\star$ -representation of $\mathcal{F}$ -algebra B in the bundle $p[A]$. We can define or $T\star$ -representation in the fiber, either define $T\star$ -representation in the set $\Gamma(p[A])$. In the former case the representation defines the same transformation in all fibers. In the later case the picture is less restrictive, however we do not have the whole picture of the diversity of representations in the bundle. Studying the representation of the fibered $\mathcal{F}$ -algebra, we point out that representations in different fibers are independent. Demand of smooth dependence of transformation on fiber put additional constrains for $T\star$ -representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra. The same time this constrain allows learn $T\star$ -representation of the fibered $\mathcal{F}$ -algebra when in the fiber there defined $\mathcal{F}$ -algebra with parameters (for instance, the structure constants of Lie group) smooth dependent on fiber.

Remark 5.9. Using diagrams we can express definition 5.6 the following way.



Map F is injection. Because we expect that representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra acts in each fiber, then we see that map F is bijection. Without loss of generality, we assume that $M = M'$ and map F is the identity map. We tell that we define the representation of the fibered $\mathcal{F}$ -algebra $p[B]$ in the bundle $p[A]$ over the set M . Since we know the base of the bundle, then to reduce details on the diagram we will describe the representation using the following diagram



□

Definition 5.10. Suppose map (5.1) is an isomorphism of the fibred $\mathcal{F}$ -algebra $p[B]$ into ${}^*p[A]$. Then the $T\star$ -representation of the fibred $\mathcal{F}$ -algebra $p[B]$ is called **effective**. $\square$

Remark 5.11. Suppose the $T\star$ -representation of fibred $\mathcal{F}$ -algebra is effective. Then we identify an element of fibred $\mathcal{F}$ -algebra and its image and write $T\star$ -transformation caused by element $a \in A$ as

$$v' = av$$

Suppose the $\star T$ -representation of $\mathcal{F}$ -algebra is effective. Then we identify an element of fibred $\mathcal{F}$ -algebra and its image and write $\star T$ -transformation caused by element $a \in A$ as

$$v' = va$$

$\square$

Definition 5.12. We call a $T\star$ -representation of fibred $\mathcal{F}$ -algebra **transitive** if for any $a, b \in V$ exists such g that

$$a = f(g)b$$

We call a $T\star$ -representation of fibred $\mathcal{F}$ -algebra **single transitive** if it is transitive and effective. $\square$

Theorem 5.13. *$T\star$ -representation is single transitive if and only if for any $a, b \in M$ exists one and only one $g \in A$ such that $a = f(g)b$*

Proof. Colorary of definitions 5.10 and 5.12. $\square$

6. REPRESENTATION OF FIBERED GROUP

Definition 6.1. Let $p[G] : \mathcal{G} - - \triangleright M$ and $p'[G'] : \mathcal{G}' - - \triangleright M'$ be two fibred groups. Bundle map

$$f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$$

is called **homomorphism of fibred groups** if respective fiber map

$$f_x : G_x \rightarrow G'_{x'}$$

is homomorphism of groups. $\square$

Definition 6.2. Let $p[G] : \mathcal{G} - - \triangleright M$ and $p'[G'] : \mathcal{G}' - - \triangleright M'$ be two fibred groups. Bundle map

$$f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$$

is called **antihomomorphism of fibred groups** if respective fiber map

$$f_x : G_x \rightarrow G'_{x'}$$

is antihomomorphism of groups. $\square$

Definition 6.3. Let $p[G]$ be fibred group. We call map

$$(6.1) \quad f : p[G] \rightarrow {}^*p[A]$$

$T\star$ -representation of fibred group $p[G]$ in bundle $p[A]$ if map f holds

$$(6.2) \quad f(ab)\mu = f(a)(f(b)\mu)$$

$$(6.3) \quad f(\epsilon) = e$$

$\square$

Definition 6.4. Let $p[G]$ be fibered group. We call map

$$(6.4) \quad f : p[G] \rightarrow p[A]^*$$

$\star T$ -representation of fibered group $p[G]$ in bundle $p[A]$ if map f holds

$$(6.5) \quad \mu f(ab) = (\mu f(a))f(b)$$

$$(6.6) \quad f(\epsilon) = e$$

□

Theorem 6.5. For any $a \in p[G]$

$$(6.7) \quad f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$$

Proof. Since (6.2) and (6.3), we have

$$\mu = e\mu = f(aa^{-1})\mu = f(a)(f(a^{-1})\mu)$$

This completes the proof. □

Theorem 6.6. Let ${}^*p[A]$ be a fibered group with respect to multiplication

$$(6.8) \quad (t_1 t_2)\mu = t_1(t_2\mu)$$

and e be unit of group ${}^*p[A]$. Let map (6.1) be a homomorphism of fibered group

$$(6.9) \quad f(ab) = f(a)f(b)$$

Then this map is representation of fibered group $p[G]$ which we call **covariant $T\star$ -representation of fibered group**.


Proof. Since f is homomorphism of fibered group, we have $f(\epsilon) = e$.

Since (6.8) and (6.9), we have

$$f(ab)\mu = (f(a)f(b))\mu = f(a)(f(b)\mu)$$

According definition 6.3 f is representation of fibered group. □

We use following diagram to represent covariant $T\star$ -representation of fibered group on the bundle



Theorem 6.7. Let ${}^*p[A]$ be a fibered group with respect to multiplication

$$(6.10) \quad (t_2 t_1) \mu = t_1 (t_2 \mu)$$

and e be unit of fibered group ${}^*p[A]$. Let map (6.1) be an antihomomorphism of fibered group

$$(6.11) \quad f(ba) = f(a)f(b)$$

Then this map is representation of fibered group $p[G]$ which we call **contravariant $T\star$ -representation of fibered group**.

Proof. Since f is antihomomorphism of fibered group, we have $f(\epsilon) = e$.

Since (6.10) and (6.11), we have

$$f(ab)\mu = (f(b)f(a))\mu = f(a)(f(b)\mu)$$

According definition 6.3 f is representation of fibered group. □

Example 6.8. The group composition on fibered group determines two different presentations on the fibered group: the **$T\star$ -shift on the fibered group** which we introduce by the equation

$$(6.12) \quad b' = a \star b = ab$$

and the **$\star T$ -shift on fibered group** which we introduce by the equation

$$(6.13) \quad b' = b \star a = ba$$

□

Example 6.9. Let $p[GL]$ be bundle over set of real numbers. Given the matrix A , we can define section $a(t) = \exp(tA)$, and this section will cause respective $T\star$ -shift.

Definition 6.10. Let f be representation of fibered group $p[G]$ in bundle $p[A]$. For any cut u of bundle $p[A]$ we define its **orbit of representation of fibered group** as set

$$\mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u) = \{v = f(g)u : g \in \Gamma(p[G])\}$$

□

Since $f(\epsilon) = e$ we have $u \in \mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$.

Theorem 6.11. Suppose

$$(6.14) \quad v \in \mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$$

Then

$$\mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u) = \mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v)$$

Proof. From (6.14) it follows that there exists $\mu \in \Gamma(p[G])$ such that

$$(6.15) \quad v = f(\mu)u$$

Suppose $\delta \in \mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v)$. Then there exists $\nu \in \Gamma(p[G])$ such that

$$(6.16) \quad \delta = f(\nu)v$$

If we substitute (6.15) into (6.16) we get

$$(6.17) \quad \delta = f(\nu)f(\mu)u$$

Since (6.2) we see that from (6.17) it follows that $\delta \in \mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$. Thus

$$\mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v) \subseteq \mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$$

Since (6.7), we see that from (6.15) it follows that

$$(6.18) \quad u = f(\mu)^{-1}v = f(\mu^{-1})v$$

From (6.18) it follows that $u \in \mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v)$ and therefore

$$\mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u) \subseteq \mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v)$$

This completes the proof. $\square$

Let us define the representation of group G on the bundle

$$p[A] : \mathcal{E} \dashrightarrow M$$

Since we call the representation transitive, then orbit of a point is the manifold $\mathcal{E}$. In the case of representation of fibered group $p[G]$ the orbit of a point is the fiber the point belongs to.

Theorem 6.12. *Suppose f_1 is representation of fibered group $p[G]$ in bundle $p[A_1]$ and f_2 is representation of fibered group $p[G]$ in bundle $p[A_2]$. Then we introduce direct product of representations f_1 and f_2 of fibered group $p[G]$*

$$\begin{aligned} f &= f_1 \otimes f_2 : p[G] \rightarrow p[A_1] \otimes p[A_2] \\ f(g) &= (f_1(g), f_2(g)) \end{aligned}$$

Proof. To show that f is representation it is enough to prove that f satisfy to definition 6.3.

$$\begin{aligned} f(e) &= (f_1(e), f_2(e)) = (e_1, e_2) = e \\ f(ab)u &= (f_1(ab)u_1, f_2(ab)u_2) \\ &= (f_1(a)(f_1(b)u_1), f_2(a)(f_2(b)u_2)) \\ &= f(a)(f_1(b)u_1, f_2(b)u_2) \\ &= f(a)(f(b)u) \end{aligned}$$

$\square$

7. SINGLE TRANSITIVE REPRESENTATION

Definition 7.1. We call **kernel of inefficiency of representation of fibered group $p[G]$** a set

$$K_f = \{g \in \Gamma(p[G]) : f(g) = e\}$$

If $K_f = \{e\}$ we call representation of fibered group G **effective**. $\square$

Theorem 7.2. *A kernel of inefficiency is a subgroup of fibered group G .*

Proof. The proof does not depend on whether we use covariant representation or contravariant representation. Assume f is covariant representation and $f(a_1) = \delta$ and $f(a_2) = \delta$. Then

$$\begin{aligned} f(a_1 a_2) &= f(a_1) f(a_2) = \delta \\ f(a^{-1}) &= f^{-1}(a) = \delta \end{aligned}$$

$\square$

Theorem 7.3. *Representation is single transitive if and only if for any $a, b \in \Gamma(p[A])$ exists one and only one $g \in p[G]$ such that $a = f(g)b$*

Proof. Statement is colorary of definitions 5.10 and 7.1 and of the theorem 7.2. $\square$

Definition 7.4. We call a bundle $p[A]$ **homogeneous bundle of fibered group** $p[G]$ if we have single transitive representation of fibered group $p[G]$ on $p[A]$. $\square$

Theorem 7.5. *If we define a single transitive $T\star$ -representation f of the fibered group $p[G]$ on the bundle $p[A]$ then we can uniquely define coordinates on $p[A]$ using coordinates on the fibered group $p[G]$.*

If f is a covariant single transitive representation than $f(a)$ is equivalent to the left shift $a\star$ on the fibered group $p[G]$. If f is a contravariant single transitive representation than $f(a)$ is equivalent to the right shift $\star a$ on the fibered group $p[G]$.

Proof. The representation of the fibered group $p[G]$ in the bundle $p[A]$ is single transitive iff the representation of the group G in the fiber A_x for any x is single transitive. Let representation f of the fibered group $p[G]$ be a covariant single transitive representation. Let u, v be sections of the bundle $p[A]$. and $x \in M$. According to theorem [3]-3.4.5 we get the only element $g_x \in G$ such that

$$u(x) = f(g_x)v(x) = g_x v(x)$$

a contravariant single transitive representation Thus the map $x \rightarrow g_x$ is the section of the fibered group $p[G]$.

The same way we prove the statement for a covariant single transitive representation.

To prove the first statement, we need to select the map on the manifold M , where both bundles are trivial. Then we can represent coordinates of the point $u \in p[A]$ as tuple of coordinates (x, y) where x are coordinates of projection to the manifold M and y are coordinates of the point in the fiber. We can represent coordinates of the point $a \in p[G]$ as tuple of coordinates (x, g) where x are coordinates of projection to the manifold M and g are coordinates of the point in the group. Respectively, coordinates of the section of the bundle $p[A]$ are the map $y : M \rightarrow A$, and coordinates of the section of the bundle $p[G]$ are the map $y : M \rightarrow G$.

We select a section $v \in \Gamma(p[A])$ and define coordinates of a point $w \in \Gamma(p[A])$ as coordinates of $a \in p[G]$ such that $w = f(a)v$. Coordinates defined this way are unique up to choice of an initial section $v \in \Gamma(p[A])$ because the action is effective. $\square$

Remark 7.6. We will write effective $T\star$ -covariant representation of the fibered group $p[G]$ as

$$v' = a \star v = av$$

Orbit of this representation is

$$p[G]v = p[G] \star v$$

$\square$

Remark 7.7. We will write effective $\star T$ -covariant representation of the fibered group $p[G]$ as

$$v' = v \star a = va$$

Orbit of this representation is

$$vp[G] = v \star p[G]$$

□


Theorem 7.8. *Left and right shifts on the fibered group $p[G]$ are commuting.*

Proof. This is the consequence of the associativity on the fibered group $p[G]$

$$(a \star \star b)c = a(cb) = (ac)b = (\star b a \star)c$$

□

Theorem 7.9. *If we defined a single transitive covariant $T\star$ -representation f of the fibered group $p[G]$ on the bundle $p[A]$ then we can uniquely define a single transitive covariant $\star T$ -representation h of the fibered group $p[G]$ on the bundle $p[A]$ such that diagram*



is commutative for any $a, b \in \Gamma(p[G])$.

Proof. Let f be a single transitive covariant $T\star$ -representation. In each fiber A_x the representation f defines a single transitive covariant $T\star$ -representation f_x of group G . According to theorem [3]-3.4.10 in fiber A_x we uniquely define a single transitive covariant $\star T$ -representation h_x comutable with representation f_x . For a section $a \in \Gamma(p[G])$ we define the section

$$h(a) : x \rightarrow h_x(a)$$

Map h is homomorphism of fibered group.

□

We call representations f and h **twin representations of the fibered group $p[G]$** .

8. REFERENCES

- [1] Serge Lang, Algebra, Springer, 2002
- [2] S. Burris, H.P. Sankappanavar, A Course in Universal Algebra, Springer-Verlag (March, 1982),
 eprint <http://www.math.uwaterloo.ca/~snburris/htdocs/ualg.html>
 (The Millennium Edition)
- [3] Aleks Kleyn, Lectures on Linear Algebra over Skew Field,
 eprint [arXiv:math.GM/0701238](https://arxiv.org/abs/math.GM/0701238) (2007)
- [4] Aleks Kleyn, Biring of Matrices,
 eprint [arXiv:math.OA/0612111](https://arxiv.org/abs/math.OA/0612111) (2006)
- [5] Paul M. Cohn, Universal Algebra, Springer, 1981
- [6] C. R. F. Maunder, Algebraic Topology, Dover Publications, Inc, Mineola, New York, 1996
- [7] J.-F. Pommaret, Partial Differential Equations and Group Theory, Springer, 1994

- [8] N. Bourbaki, General Topology, Chapters 1 - 4, Springer, 1989
- [9] Allen Hatcher, Algebraic Topology, Cambridge University Press, 2002

9. INDEX

- antihomomorphism of fibered groups [13](#)
- arity of operation [7](#)
- base of map [3](#)
- Cartesian power A of set B [2](#)
- Cartesian power of bundle [7](#)
- direct product of bundles [5](#)
- direct product of total spaces [5](#)
- compact-open topology [2](#)
- contravariant $T\star$ -representation of fibered group [15](#)
- covariant $T\star$ -representation of fibered group [14](#)
- direct product of representations of fibered group [16](#)
- effective representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra [13](#)
- effective $T\star$ -representation of fibered group [16](#)
- fibered $\mathcal{F}$ -algebra [9](#)
- fibered $\mathcal{F}$ -subalgebra [10](#)
- fibered group [9](#)
- fibered ring [9](#)
- homogeneous bundle of fibered group [17](#)
- homomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebras [10](#)
- homomorphism of fibered groups [13](#)
- isomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebras [10](#)
- kernel of inefficiency of representation of fibered group [16](#)
- left shift on fiberd group [15](#)
- left-side representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra [11](#)
- left-side transformation on bundle [11](#)
- lift of map [3](#)
- mapping space [2](#)
- operation on bundle [7](#)
- orbit of representation of fibered group [15](#)
- reduced Cartesian product of bundles [6](#)
- reduced Cartesian product of total spaces [6](#)
- right-side representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra [12](#)
- single transitive representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra [13](#)
- $\star T$ -shift on fibered group [15](#)
- $\star T$ -representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra [12](#)
- $\star T$ -representation of fibered group [14](#)
- $\star T$ -transformation on bundle [11](#)
- transformation on bundle [11](#)
- transitive representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra [13](#)
- $T\star$ -representation of fibered $\mathcal{F}$ -algebra [11](#)
- $T\star$ -representation of fibered group [13](#)
- $T\star$ -transformation on bundle [11](#)
- twin representations of fibered group [18](#)
- vector bundle [9](#)

10. SPECIAL SYMBOLS AND NOTATIONS

- $b \star a$ $\star T$ -shift 15
 $a \star b$ $T\star$ -shift 15
 B^A Cartesian power A of set B 2
 $\mathcal{E}^n$ Cartesian power of total spaces 7
 $\mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_n$ Cartesian product of total spaces 5
 e identical transformation of bundle 11
 $\mathcal{E}_1 \odot \dots \odot \mathcal{E}_n$ reduced Cartesian product of total spaces 6
 $\mathcal{E}^\star$ set of nonsingular $\star T$ -transformations of bundle $\mathcal{E}$ 11
 $^\star \mathcal{E}$ set of nonsingular $T\star$ -transformations of bundle $\mathcal{E}$ 11
 f homomorphism of fibered $\mathcal{F}$ -algebras 10
 $f = (f_1, \dots, f_n)$ map to Cartesian product 4
 $vp[G]$ orbit of effective covariant $\star T$ -representation of fibered group 17
 $p[G]v$ orbit of effective covariant $T\star$ -representation of fibered group 17
 $\mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$ orbit of representation of fibered group $\mathcal{G}$ 15
 $p[E] : \mathcal{E} \dashrightarrow M$ bundle 2
 $p[E]^n$ Cartesian power of bundle 7
 $p_1[E_1] \times \dots \times p_n[E_n]$ Cartesian product of bundles 4
 $p_1[E_1] \odot \dots \odot p_n[E_n]$ reduced Cartesian product of bundles 6
 $p[A]^\star$ set of nonsingular $\star T$ -transformations of bundle $p[E]$ 11
 $^\star p[E]$ set of nonsingular $T\star$ -transformations of bundle $p[E]$ 11
 $\Gamma(p[E])$ set of sections of bundle 2
 $\prod_{i=1}^n p_i[E_i]$ Cartesian product of bundles 4
 $\prod_{i=1}^n \mathcal{E}_i$ Cartesian product of total spaces 5
 $\odot_{i=1}^n p_i[E_i]$ reduced Cartesian product of bundles 6
 $\odot_{i=1}^n \mathcal{E}_i$ reduced Cartesian product of total spaces 6

Расслоенная $\mathcal{F}$ -алгебра

Александр Клейн

Аннотация. Понятие $\mathcal{F}$ -алгебры и её представления может быть перенесено на произвольное расслоение. Операции расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры определены послойно. В статье рассмотрена теория представлений расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры, а также проведено сравнение представления $\mathcal{F}$ -алгебры и представления расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры.

Теория представления алгебры имеет длинную и богатую историю. На протяжении XX столетия теория представления стала неотъемлемой частью многих приложений. Переход от алгебры к расслоенной алгебре открывает новые возможности. Я предпринял попытку написать эту статью с целью увидеть новые свойства расслоенной алгебры.

Так как сечения расслоения может быть не определено на всём расслоении, все утверждения предполагают некоторую область определения. Подобные утверждения строятся по образцу утверждения о существовании тривиального касательного расслоения на многообразии.

Однако существует другая группа утверждений, ограничивающих область определения расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры. В тексте приведены соответствующие примеры. Данная ситуация сводится к следующему.

Преобразование слоя при параллельном переносе предполагается взаимно однозначным отображением. Непрерывно перемещаясь вдоль базы, мы непрерывно переходим от слоя к другому. Предположение, что отображение между слоями является гомеоморфизмом, гарантирует непрерывную деформацию слоя.

Если мы выберем точку в слое, то её траектория при движении проекции вдоль базы будет параллельна базе. В дифференциальной геометрии подобные кривые называются горизонтальными. Мы так же будем придерживаться этого термина.

Если мы предполагаем на слое структуру $\mathcal{F}$ -алгебры, то соответствующее отображение должно быть изоморфизмом $\mathcal{F}$ -алгебры. Непрерывность позволяет сохранить при параллельном переносе изучаемые конструкции, сделать переход от слоя к слою практически незамеченным.

Эта картина хорошо работает в малом. Когда мы переходим к конечным отрезкам на базе, непрерывность становится ответственной за то, что мы не можем продлить структуру $\mathcal{F}$ -алгебры сколь угодно далеко. Например, могут появиться точки, где гомеоморфизм может быть нарушен. Это происходит, когда пересекаются горизонтальные кривые или изменяются топологические свойства слоя. Соответствующий слой мы называем вырожденным, а его проекцию - точкой вырождения.

Key words and phrases. дифференциальная геометрия, расслоения, алгебра.
Aleks_Kleyn@MailAPS.org.

Вопрос о том, как много точек вырождения, вообще говоря, непростой. Интуитивно ясно, что это множество невелико по сравнению с базой. Тем не менее, это множество может оказаться существенным для изучения геометрии расслоения или физических процессов, связанных с этим расслоением.

К подобным явлениям в теории дифференциальных уравнений относится задача продления решения дифференциального уравнения. В тоже время, дифференциальное уравнение может иметь два типа решения. Регулярное решение принадлежит некоторому семейству функций, зависящих от произвольных постоянных. Особое решение является огибающей семейства регулярных решений.

Задача описания слоёв расслоения, независимо от того вырождены они или нет, имеет интересное решение. Любой путь на базе расслоения является отображением отрезка $I = [0, 1]$ в базу расслоения. Мы можем предположить, что слои расслоения не гомеоморфны, но гомотопны.

Группа голономий расслоения также накладывает ограничение на структуру расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры $\mathcal{A} = p[A]$. Естественно предположить, что при параллельном переносе мы гомоморфно отображаем $\mathcal{F}$ -алгебру из одного слоя в другой. Следовательно, предполагается, что преобразование, порождённое параллельным переносом вдоль замкнутого контура является гомоморфизмом $\mathcal{F}$ -алгебры. Таким образом, всё хорошо, если группа голономий расслоения $\mathcal{A}$ является подгруппой группы гомоморфизмов $\mathcal{F}$ -алгебры A . В этом случае мы будем называть расслоенную $\mathcal{F}$ -алгебру $\mathcal{A}$ голономной. В противном случае мы будем называть расслоенную $\mathcal{F}$ -алгебру $\mathcal{A}$ неголономной.

Из теории векторных расслоений известно, что не всякая расслоенная $\mathcal{F}$ -алгебра является голономной. В тоже время, теория векторных расслоений предлагает рецепт каким образом мы можем работать с неголономной расслоенной $\mathcal{F}$ -алгеброй.

Это замечание относится также к теории представления расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры.

Чтобы сделать новые конструкции более наглядными, я строю соответствующие диаграммы.

Обозначения операций и отношений по возможности сохраняются как они введены в теории множеств. Это не приводит к недоразумениям, так как обозначения расслоений отличны от обозначений множеств. Для обозначения расслоения и слоя я буду пользоваться одной и той же буквой в разных алфавитах.

Проекция расслоения, сечение, морфизм расслоений предполагаются непрерывными отображениями.

1. РАССЛОЕНИЕ

Допустим M - многообразие и

$$(1.1) \quad p[E] : \mathcal{E} \longrightarrow M$$

расслоение над M со слоем E .¹ Символ $p[E]$ означает, что E является типичным слоем расслоения. Множество $\mathcal{E}$ является областью определения отображения $p[E]$. Множество M является областью значений отображения $p[E]$. Мы будем

¹Так как мне придётся иметь дело с различными расслоениями, я буду пользоваться следующим соглашением. Для обозначения расслоения и слоя я буду пользоваться одной и той же буквой в разных алфавитах.

отождествлять непрерывное отображение $p[E]$ и расслоение (1.1). Обозначим через $\Gamma(p[E])$ множество сечений расслоения $p[E]$.

Декартова степень A множества B - это множество B^A отображений $f : A \rightarrow B$ ([5], стр. 18). Рассмотрим подмножества B^A вида

$$W_{K,U} = \{f : A \rightarrow B | f(K) \subset U\}$$

где K - компактное подмножество пространства A , U - открытое подмножество пространства B . Множества $W_{K,U}$ образуют базис топологии пространства B^A . Эта топология называется **компактно-открытой топологией**. Декартова степень A множества B , снабжённая компактно-открытой топологией называется, **пространством отображений** ([6], стр. 213).

Согласно [6], стр. 214 для данных пространств A, B, C, D и отображений $f : A \rightarrow C, g : D \rightarrow B$ мы определим морфизм пространства отображений

$$g^f : D^C \rightarrow B^A$$

равенством

$$g^f(h) = fhg \quad h : C \rightarrow D \quad g^f(h) : A \rightarrow B$$

Таким образом, морфизм пространства отображений можно представить с помощью диаграммы

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & C \\ g^f(h) \downarrow & & \downarrow h \\ B & \xleftarrow{g} & D \end{array}$$

Множество $\Gamma(\mathcal{E})$ является подмножеством множества $\mathcal{E}^M$. Поэтому мы можем перенести на множество сечений понятия, определённые для пространства отображений. Множества $W_{K,U}$ мы определим следующим образом

$$W_{K,U} = \{f \in \Gamma(\mathcal{E}) | f(K) \subset U\}$$

где K - компактное подмножество пространства M , U - открытое подмножество пространства $\mathcal{E}$.

Замечание 1.1. Я пользуюсь стрелкой $-->$ на диаграмме для обозначения проекции расслоения. $\square$

Замечание 1.2. Я пользуюсь стрелкой $\cdots\cdots\cdots>$ на диаграмме для обозначения сечения расслоения. $\square$

Пусть f - морфизм расслоения $\mathcal{E}$ в $\mathcal{E}'$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{f} & \mathcal{E}' \\ | & & | \\ | p[E] & & | p'[E'] \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ M & \xrightarrow{F} & M' \end{array}$$

Отображение F называется **базой отображения f** . Отображение называется **лифтом отображения F** .

Если отображение F - биекция, то отображение f определяет морфизм $f^{F^{-1}}$ пространств сечений $\Gamma(p[E])$ в $\Gamma(p'[E'])$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{f} & \mathcal{E}' \\ \uparrow \text{A} & \text{f}^{F^{-1}} & \uparrow \text{A}' \\ u & \xrightarrow{\quad} & u' \\ \vdots & & \vdots \\ M & \xrightarrow{F} & M' \end{array} \quad u' = f^{F^{-1}}(u) = fuF^{-1}$$

Чтобы доказать непрерывность u' , достаточно доказать непрерывность F^{-1} . Но это очевидно, так как F непрерывная биекция.

Если $F = \text{id}$, то $\text{id}^{-1} = \text{id}$. Поэтому морфизм пространств сечений мы будем обозначать f^{id} . Очевидно

$$f^{\text{id}}(u) = fu$$

2. ДЕКАРТОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ РАССЛОЕНИЙ

Замечание 2.1. Пусть $A_1 \times \dots \times A_n$ является декартовым произведением множеств $A_1, \dots, A_n$

$$\begin{array}{ccc} & A_1 \times \dots \times A_n & \\ p_1 \swarrow & \downarrow & \searrow p_n \\ A_1 & \dots & A_n \end{array}$$

Согласно [1] отображение

$$f : A \rightarrow A_1 \times \dots \times A_n$$

можно представить в форме кортежа $f = (f_1, \dots, f_n)$, где $f_i = fp_i$

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & A_1 \times \dots \times A_n & & \\ & \searrow f_1 & \swarrow p_1 \downarrow p_n & & \\ & A_1 & \dots & & A_n \\ & \searrow f_n & & & \end{array}$$

□

Допустим $p_i[E_i] : \mathcal{E}_i \dashrightarrow M_i$, $i = 1, \dots, n$ - семейство расслоений. Для каждого i пусть задано покрытие $\{U_{i\alpha_i}\}$ базы M_i такое, что для любого $U_{i\alpha_i}$ существует локальная тривиализация $\varphi_{i\alpha_i}$ расслоения $p_i[E_i]$

$$\begin{array}{ccc} U_{i\alpha_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\alpha_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & U_{i\alpha_i} & \end{array}$$

Определение 2.2. Для произвольной точки $x_i \in M_i$ выберем открытое множество $U_{i\alpha_i}$, $i = 1, \dots, n$ такое, что $x_i \in U_{i\alpha_i}$. Мы можем представить точку множества $\mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}}$ в виде кортежа (x_i, a_i) , $x_i \in U_{i\alpha_i}$, $a_i \in E_i$. Для кортежа $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ рассмотрим тривиальное расслоение

$$e_\alpha : \mathcal{E}_\alpha \dashrightarrow U_\alpha = U_{1\alpha_1} \times \dots \times U_{n\alpha_n}$$

элементами которого являются кортежи $(x_1, \dots, x_n, a_1, \dots, a_n)$. Слоем этого расслоения является декартовым произведением $\prod_{i=1}^n E_i$. База расслоения является декартовым произведением $\prod_{i=1}^n U_{i\alpha_i}$. $\square$

Непрерывность проекции этого расслоения следует из следствия 1 предложения 1 ([8], стр. 59).

Чтобы определить расслоение над многообразием $\prod_{i=1}^n M_i$, мы должны определить функции склеивания. Пусть заданы функции склеивания $\psi_{i\alpha_i\beta_i}$ расслоения $p_i[E_i]$

$$\begin{array}{ccc} U_{i\alpha_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\alpha_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}} \\ (p_i, \bar{\psi}_{i\alpha_i\beta_i}) \downarrow & & \downarrow \psi_{i\alpha_i\beta_i} \\ U_{i\beta_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\beta_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\beta_i}} \end{array}$$

Если $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, то мы определим склеивающее отображение, пользуясь диаграммой

$$\begin{array}{ccc} U_\alpha \times E_1 \times \dots \times E_n & \xrightarrow{id} & \mathcal{E}|_{U_\alpha} \\ (p, \bar{\psi}_{1\alpha_1\beta_1}, \dots, \bar{\psi}_{n\alpha_n\beta_n}) \downarrow & & \downarrow \psi_{\alpha\beta} \\ U_\beta \times E_1 \times \dots \times E_n & \xrightarrow{id} & \mathcal{E}|_{U_\beta} \end{array}$$

Расслоение

$$p_1[E_1] \times \dots \times p_n[E_n] = \prod_{i=1}^n p_i[E_i] = p[\prod_{i=1}^n E_i] : \mathcal{E} \rightarrow M$$

называется **декартовым произведением расслоений** $p_i[E_i]$. Мы будем также говорить, что расслоенное пространство $\mathcal{E}$ является **декартовым произведением расслоенных пространств** $\mathcal{E}_i$ и пользоваться обозначением

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_n = \prod_{i=1}^n \mathcal{E}_i$$

Замечание 2.3. Согласно замечанию 2.1 сечение декартового произведения расслоений $p_1[E_1] \times \dots \times p_n[E_n]$ можно представить в виде кортежа сечений $a = (a_1, \dots, a_n)$. $\square$

Мы будем пользоваться следующими диаграммами для представления декартового произведения расслоений

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{E} & \\ p_1 \swarrow & & \searrow p_n \\ & \times \dots \times & \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_1 & \dots & M_n \end{array} \quad \begin{array}{c} \mathcal{E} \\ | \\ \prod_{i=1}^n p_i \\ | \\ M_i \end{array}$$

На диаграмме стрелки, объединённые знаком $\times$ или $\prod$, символизируют стрелку, соответствующую проекции расслоения $\mathcal{E}$. Цель обозначения - показать структуру отображения.

В декартовом произведении расслоений определено произведение любых двух слоёв. Как мы увидим ниже, такое расслоение воспроизводит структуру базы. Это существенно ограничивает применимость декартова произведения расслоений.

3. ПРИВЕДЕННОЕ ДЕКАРТОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ РАССЛОЕНИЙ

Если расслоения определены над общей базой мы можем изменить определение декартова произведения расслоений.

Допустим $p_i[E_i] : \mathcal{E}_i \rightarrow M$, $i = 1, \dots, n$ - семейство расслоений над многообразием M . Для каждого i пусть задано покрытие $\{U_{i\alpha_i}\}$ базы M такое, что для любого $U_{i\alpha_i}$ существует локальная тривиализация $\varphi_{i\alpha_i}$ расслоения $p_i[E_i]$

$$\begin{array}{ccc} U_{i\alpha_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\alpha_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & U_{i\alpha_i} & \end{array}$$

Определение 3.1. Для произвольной точки $x \in M$ выберем открытые множества $U_{i\alpha_i}$, $i = 1, \dots, n$ такие, что $x \in U_{i\alpha_i}$. Мы можем представить точку множества $\mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}}$ в виде кортежа (x, a_i) , $x \in U_{i\alpha_i}$, $a_i \in E_i$. Для кортежа $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ рассмотрим тривиальное расслоение $p_\alpha : \mathcal{E}_\alpha \rightarrow U_\alpha = \bigcap_{i=1}^n U_{i\alpha_i}$, элементами которого являются кортежи $(x, a_1, \dots, a_n)$. Слоем этого расслоения является декартово произведение $\prod_{i=1}^n E_i$. База расслоения является множеством U_α . $\square$

Согласно определению построенное расслоение над множеством U_α можно представить в виде

$$U_\alpha \times \prod_{i=1}^n E_i$$

Согласно [8], стр. 58, если U принадлежит базису топологии пространства U_α , то $U \times \prod_{i=1}^n E_i$ принадлежит базису топологии пространства $\mathcal{E}_\alpha$. Если U открытое множество пространства M , то мы можем представить множество U в виде $U = \bigcup_{i \in I} U_i$, где U_i принадлежат базису топологии пространства M . Соответственно, множество

$$p_\alpha^{-1}(U) = U \times \prod_{i=1}^n E_i$$

может быть представлено в виде

$$p_\alpha^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} (U_i \times \prod_{i=1}^n E_i)$$

и является открытым множеством. Следовательно, проекция p_α является непрерывным отображением.

Чтобы определить расслоение над многообразием M , мы должны определить функции склеивания. Пусть заданы функции склеивания $\psi_{i\alpha_i\beta_i}$ расслоения $p_i[E_i]$

$$\begin{array}{ccc} U_{i\alpha_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\alpha_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\alpha_i}} \\ (p_i, \bar{\psi}_{i\alpha_i\beta_i}) \downarrow & & \downarrow \psi_{i\alpha_i\beta_i} \\ U_{i\beta_i} \times E_i & \xrightarrow{\varphi_{i\beta_i}} & \mathcal{E}_i|_{U_{i\beta_i}} \end{array}$$

Если $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, то мы определим склеивающее отображение, пользуясь диаграммой

$$\begin{array}{ccc} U_\alpha \times E_1 \times \dots \times E_n & \xrightarrow{id} & \mathcal{E}|_{U_\alpha} \\ (p, \bar{\psi}_{1\alpha_1\beta_1}, \dots, \bar{\psi}_{n\alpha_n\beta_n}) \downarrow & & \downarrow \psi_{\alpha\beta} \\ U_\beta \times E_1 \times \dots \times E_n & \xrightarrow{id} & \mathcal{E}|_{U_\beta} \end{array}$$

Расслоение

$$p_1[E_1] \odot \dots \odot p_n[E_n] = \bigodot_{i=1}^n p_i[E_i] = p[\prod_{i=1}^n E_i] : \mathcal{E} \dashrightarrow M$$

называется **приведенным декартовым произведением расслоений** $p_i[E_i]$. Мы будем также говорить, что расслоенное пространство $\mathcal{E}$ является **приведенным декартовым произведением расслоенных пространств** $\mathcal{E}_i$ и пользоваться обозначением

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \odot \dots \odot \mathcal{E}_n = \bigodot_{i=1}^n \mathcal{E}_i$$

Замечание 3.2. Согласно замечанию 2.1 сечение приведенного декартового произведения расслоений $p_1[E_1] \odot \dots \odot p_n[E_n]$ можно представить в виде кортежа сечений $a = (a_1, \dots, a_n)$. $\square$

Мы будем пользоваться следующими диаграммами для представления приведенного декартового произведения расслоений

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{E} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ p_1 & \bigodot \dots \bigodot & p_n \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & M & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & \mathcal{E} & \\ & \downarrow & \\ & \bigodot_{i=1}^n p_i & \\ & \downarrow & \\ & M & \end{array}$$

На диаграмме стрелки, объединённые знаком $\odot$, символизируют стрелку, соответствующую проекции расслоения $\mathcal{E}$. Цель обозначения - показать структуру отображения.

В приведенном декартовом произведении определено произведение слоёв над заданной точкой. Это делает структуру произведения богаче.

Определение 3.3. Для $n \geq 0$ мы определим **декартову степень расслоения**²

$$\begin{cases} p[E]^0 = id : M \dashrightarrow M & n = 0 \\ p[E]^n = \odot_{i=1}^n p[E] : \mathcal{E}^n \dashrightarrow M & n > 0 \end{cases}$$

□


4. РАССЛОЕННАЯ $\mathcal{F}$ -АЛГЕБРА

Определение 4.1. n -арная операция на расслоении $p[E]$ - это морфизм расслоений

$$f : \mathcal{E}^n \rightarrow \mathcal{E}$$

n - это **арность операции**. 0-арная операция - это сечение расслоения $p[A]$. □

Операция на расслоении может быть представлена диаграммой



Теорема 4.2. Пусть U - открытое множество базы M , и на U существует тривиализация расслоения $p[E]$. Пусть $x \in M$. Пусть ω - n -арная операция на расслоении $p[E]$ и

$$\omega(p_1, \dots, p_n) = p$$

в слое E_x . Тогда существуют открытые множества $V \subseteq U$, $W \subseteq E$, $W_1 \subseteq E_1$, ..., $W_n \subseteq E_n$ такие, что $x \in V$, $p \in W$, $p_1 \in W_1$, ..., $p_n \in W_n$, и для любых $x' \in V$, $p' \in W \cap \omega V$ существуют $p'_1 \in W_1$, ..., $p'_n \in W_n$ такие, что

$$\omega(p'_1, \dots, p'_n) = p'$$

в слое $E_{x'}$.

Доказательство. Согласно [8], стр. 58, множества вида $V \times W$, где V принадлежит базису топологии пространства U и W принадлежит базису топологии пространства E , образуют базис топологии пространства $\mathcal{E}$. Аналогично множества вида $V \times W_1 \times \dots \times W_n$, где V принадлежит базису топологии пространства U и $W_1, \dots, W_n$ принадлежат базису топологии пространства E , образуют базис топологии пространства $\mathcal{E}^n$.

Так как отображение ω непрерывно, то для открытого множества $V \times W$ существует открытое множество $S \subseteq \mathcal{E}^n$ такое, что $\omega S \subseteq V \times W$. Пусть $x' \in V$. Выберем произвольную точку $(x', p') \in \omega S$. Тогда существуют такие $p'_1 \in E_{x'}$, ..., $p'_n \in E_{x'}$, что

$$\omega(p'_1, \dots, p'_n) = p'$$

²Поскольку я рассматриваю определение декартовой степени расслоения только в рамках приведенного декартова произведения, я не буду пользоваться соответствующим прилагательным для степени. Это замечание справедливо для всех последующих определений, связанных с декартовой степенью расслоения.

в слое $E_{x'}$. Согласно сказанному выше существуют множества R, R' , принадлежащие базису топологии пространства U , и множества $T_1, \dots, T_n, T'_1, \dots, T'_n$, принадлежащие базису топологии пространства E , такие, что $x \in R, x' \in R', p_1 \in T_1, p'_1 \in T'_1, \dots, p_n \in T_n, p'_n \in T'_n, R \times T_1 \times \dots \times T_n \subseteq S, R' \times T'_1 \times \dots \times T'_n \subseteq S$. Теорема доказана, так как $W_1 = T_1 \cup T'_1, \dots, W_n = T_n \cup T'_n$ - открытые множества. $\square$

Теорема 4.2 говорит о непрерывности операции ω , однако эта теорема ничего не говорит о множествах $W_1, \dots, W_n$. В частности, эти множества могут быть не связными.

Если топология на слое A - дискретна, то мы можем положить $W = \{p\}$, $W_1 = \{p_1\}, \dots, W_n = \{p_n\}$. Возникает ощущение, что в окрестности V операция не зависит от слоя. Мы будем говорить, что операция ω локально постоянна. Однако на расслоении в целом условие постоянства может быть нарушено. Так расслоение над окружностью со слоем группы целых чисел может окантаться накрытием окружности $R \rightarrow S^1$ действительной прямой, определённым формулой $p(t) = (\sin t, \cos t)$ для любого $t \in R$.

Рассмотрим альтернативную точку зрения на непрерывность операции ω , чтобы лучше понять значение непрерывности. Если мы хотим показать, что бесконечно малые изменения операндов при движении вдоль базы приводят к бесконечно малому изменению операции, нам надо перейти к сечениям. Этот переход допустим, так как операция на расслоении определена послойно.

Теорема 4.3. *n -арная операция на расслоении отображает сечения в сечение.*

Доказательство. Допустим $f_1, \dots, f_n$ - сечения и отображение

$$(4.1) \quad f = \omega^{\text{id}}(f_1, \dots, f_n) : M \rightarrow \mathcal{E}$$

определено равенством

$$(4.2) \quad f(x) = \omega(f_1(x), \dots, f_n(x))$$

Пусть $x \in M$ и $u = f(x)$. Пусть U - окрестность точки u в области значений отображения f .

Так как ω непрерывное отображение, то согласно [8], стр. 58, для любого значения i , $1 \leq i \leq n$ в области значений сечения f_i определено открытое множество U_i таким образом, что $\prod_{i=1}^n U_i$ открыто в области значений сечения $(f_1, \dots, f_n)$ расслоения $\mathcal{E}^n$ и


$$\omega\left(\prod_{i=1}^n U_i\right) \subseteq U$$

Пусть $u' \in U$. Поскольку f - отображение, существует $x' \in M$ такая, что $f(x') = u'$. На основании равенства (4.2) существуют $u'_i \in U_i, p(u'_i) = x'$ такие, что $\omega(u'_1, \dots, u'_n) = u'$. Так как f_i сечение, то существует открытое в M множество V_i такое, что $f_i(V_i) \subseteq U_i$ и $x \in V_i, x' \in V_i$. Следовательно, множество

$$V = \cap_{i=1}^n V_i$$

непусто, открыто в M и $x \in V, x' \in V$. Следовательно отображение f непрерывно и является сечением. $\square$

Операция на расслоении может быть представлена диаграммой



Теорема 4.4. ω^{id} непрерывна на $\Gamma(\mathcal{E})$.

Доказательство. Рассмотрим множество $W_{K,U}$, где K - компактное подмножество пространства M , U - открытое подмножество пространства $\mathcal{E}$. Множество U мы можем представить в виде $V \times E$, где V - открытое множество пространства M , $K \subset V$. $\omega^{-1}(V \times E) = V \times E^n$ является открытым множеством. Следовательно,

$$(4.3) \quad (\omega^{\text{id}})^{-1}W_{K,V \times E} = W_{K,V \times E^n}$$

Из (4.3) следует непрерывность ω^{id} . $\square$

Определение 4.5. Пусть A является $\mathcal{F}$ -алгеброй ([2]). Мы можем перенести $\mathcal{F}$ -алгебраическую структуру со слоя A на расслоение $p[A] : \mathcal{A} \rightarrow M$. Если на $\mathcal{F}$ -алгебре A определена операция ω

$$a = \omega(a_1, \dots, a_n)$$

то на расслоении определена операция ω

$$a(x) = \omega(a_1, \dots, a_n)(x) = \omega(a_1(x), \dots, a_n(x))$$

Мы будем говорить, что $p[A]$ - это **расслоенная $\mathcal{F}$ -алгебра**. $\square$

В зависимости от структуры мы будем говорить, например, о **расслоенной группе, расслоенном кольце, векторном расслоении**.

Основные свойства $\mathcal{F}$ -алгебры сохраняются и для расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры. При доказательстве соответствующих теорем, мы можем сослаться на это утверждение. Однако в некоторых случаях доказательство может представлять самостоятельный интерес, так как позволяет лучше увидеть структуру расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры. Однако свойства $\mathcal{F}$ -алгебры, возникшей на множестве сечений, могут отличаться от свойств $\mathcal{F}$ -алгебры в слое. Например, умножение в слое может иметь обратный элемент. В тоже время умножение сечений может не иметь обратного элемента. Следовательно, расслоенное непрерывное поле порождает кольцо на множестве сечений. Это является преимуществом при изучении расслоенной алгебры. Я хочу также обратить внимание на то, что операция в расслоении не определена для элементов, принадлежащим разным слоям.

Точка $p \in \mathcal{A}$ имеет представление (x, p_α) в карте U_α и представление (x, p_β) в карте U_β . Допустим функции перехода $g_{\epsilon\delta}$ определяют расслоение $\mathcal{B}$ над базой N . Рассмотрим карты $V_\epsilon \in N$ и $V_\delta \in N$, $V_\epsilon \cap V_\delta \neq \emptyset$. Точка $q \in \mathcal{B}$ имеет представление (y, q_ϵ) в карте V_ϵ и представление (y, q_δ) в карте V_δ . Следовательно,

$$p_\alpha = f_{\alpha\beta}(p_\beta)$$

$$q_\epsilon = g_{\epsilon\delta}(q_\delta)$$

Представление соответствия при переходе от карты U_α к карте U_β и от карты V_ϵ к карте V_δ изменяется согласно закону

$$(x, y, p_\alpha, q_\epsilon) = (x, y, f_{\alpha\beta}(p_\beta), g_{\epsilon\delta}(q_\delta))$$

Это согласуется с преобразованием при переходе от карты $U_\alpha \times V_\epsilon$ к карте $U_\beta \times V_\delta$ в расслоении $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$.

Теорема 4.6. *Допустим функции перехода $f_{\alpha\beta}$ определяют расслоенную $\mathcal{F}$ -алгебру $p[A] : \mathcal{A} \dashrightarrow M$ над базой M . Тогда функции перехода $f_{\alpha\beta}$ являются гомоморфизмами $\mathcal{F}$ -алгебры A .*

Доказательство. Пусть $U_\alpha \in M$ и $U_\beta \in M$, $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ - окрестности, в которых расслоенная $\mathcal{F}$ -алгебра $p[A]$ тривиальна. Пусть

$$(4.4) \quad a_\beta = f_{\beta\alpha}(a_\alpha)$$

функция перехода из расслоения $p[A]|_{U_\alpha}$ в расслоение $p[A]|_{U_\beta}$. Пусть ω - n -арная операция и точки $e_1, \dots, e_n$ принадлежат слою A_x , $x \in U_1 \cap U_2$. Положим

$$(4.5) \quad e = \omega(e_1, \dots, e_n)$$

Мы можем представить точку $e \in p[A]|_{U_\alpha}$ в виде (x, e_α) и точку $e_i \in p[A]|_{U_\alpha}$ в виде $(x, e_{i\alpha})$. Мы можем представить точку $e \in p[A]|_{U_\beta}$ в виде (x, e_β) и точку $e_i \in p[A]|_{U_\beta}$ в виде $(x, e_{i\beta})$. Согласно (4.4)

$$(4.6) \quad e_\beta = f_{\beta\alpha}(e_\alpha)$$

$$(4.7) \quad e_{i\beta} = f_{\beta\alpha}(e_{i\alpha})$$

Согласно (4.5), операция в слое A_x над окрестностью U_β имеет вид

$$(4.8) \quad e_\beta = \omega(e_{1\beta}, \dots, e_{n\beta})$$

Подставив (4.6), (4.7) в (4.8) мы получим

$$f_{\beta\alpha}(e_\alpha) = \omega(f_{\beta\alpha}(e_{1\alpha}), \dots, f_{\beta\alpha}(e_{n\alpha}))$$

Это доказывает, что $f_{\beta\alpha}$ является гомоморфизмом $\mathcal{F}$ -алгебры. $\square$

Определение 4.7. Пусть $p[A] : \mathcal{A} \dashrightarrow M$ и $p'[A'] : \mathcal{A}' \dashrightarrow M'$ - две расслоенные $\mathcal{F}$ -алгебры. Мы будем называть морфизм расслоений

$$f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$$

гомоморфизмом расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр, если соответствующее отображение слоёв

$$f_x : A_x \rightarrow A'_x$$

является гомоморфизмом $\mathcal{F}$ -алгебры A . $\square$

Определение 4.8. Пусть $p[A] : \mathcal{A} \dashrightarrow M$ и $p'[A'] : \mathcal{A}' \dashrightarrow M'$ - две расслоенные $\mathcal{F}$ -алгебры. Мы будем называть гомоморфизм расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр f **изоморфизмом расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр**, если соответствующее отображение слоёв

$$f_x : A_x \rightarrow A'_x$$

является изоморфизмом $\mathcal{F}$ -алгебры A . $\square$

Определение 4.9. Пусть $p[A] : \mathcal{A} \dashrightarrow M$ - расслоенная $\mathcal{F}$ -алгебра и A' - $\mathcal{F}$ -подалгебра $\mathcal{F}$ -алгебры A . Расслоенная $\mathcal{F}$ -алгебра $p[A'] : \mathcal{A}' \dashrightarrow M$ является **расслоенной $\mathcal{F}$ -подалгеброй** расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры $p[A]$, если гомоморфизм расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр $\mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}$ является вложением слоёв. $\square$

Важным обстоятельством в этом определении является гомоморфизм расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр. Если мы просто ограничимся фактом существования $\mathcal{F}$ -подалгебры в каждом слое, то мы можем разрушить непрерывность.

Мы определили операцию на базе приведенного декартова произведения расслоений. Если мы определим операцию на базе декартова произведения расслоений, то операция будет определена для любых элементов расслоения. Однако, если $p(a_i) = p(b_i)$, $i = 1, \dots, n$, то $p(\omega(a_1, \dots, a_n)) = p(\omega(b_1, \dots, b_n))$. Следовательно, операция определена между слоями и посредством проекции переносится на базу. Эта конструкция не отличается от факторизации $\mathcal{F}$ -алгебры и не создаёт новый элемент в теории расслоений. В то же время эта конструкция довольно проблематична с точки зрения перехода между различными картами расслоения и возможности определения операции над сечениями.

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАССЛОЕННОЙ $\mathcal{F}$ -АЛГЕБРЫ

Определение 5.1. Мы будем называть морфизм расслоений

$$t : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$$

преобразованием расслоения, если соответствующее отображение слоёв

$$t_x : E_x \rightarrow E_x$$

является преобразованием слоя. $\square$

Теорема 5.2. Пусть U - открытое множество базы M , на котором существует тривиализация расслоения $p[E]$. Пусть t - преобразование расслоения $p[E]$. Пусть $x \in M$ и $p' = t_x(p)$ в слое E_x . Тогда для открытого множества $V \subseteq M$, $x \in V$ и для открытого множества $W' \subseteq E$, $p' \in W'$ существует открытое множество $W \subseteq E$, такое, что если $x_1 \in V$, $p_1 \in W$, то $p'_1 = t_{x_1}(p_1) \in W'$.

Доказательство. Согласно [8], стр. 58, множества вида $V \times W$, где V принадлежит базису топологии пространства U и W принадлежит базису топологии пространства E , образуют базис топологии пространства $\mathcal{E}$.

Так как отображение t непрерывно, то для открытого множества $V \times W'$ существует открытое множество $V \times W$ такое, что $t(V \times W) \subseteq V \times W'$. Это и есть содержание теоремы. $\square$

Теорема 5.3. Преобразованием расслоения $p[E]$ отображает сечение в сечение.

Доказательство. Образ сечения s при преобразовании t определён из коммутативности диаграммы

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{t} & \mathcal{E} \\ & \searrow s & \nearrow s' \\ & M & \end{array}$$

Непрерывность отображения s' следует из теоремы 5.2. $\square$

Определение 5.4. Преобразование расслоения называется **левосторонним преобразованием** или **$T\star$ -преобразованием расслоения**, если оно действует слева

$$u' = tu$$

Мы будем обозначать $\star\mathcal{E}$ или $\star p[E]$ множество невырожденных $T\star$ -преобразований расслоения $p[E]$. $\square$

Определение 5.5. Преобразование называется **правосторонним преобразованием** или **$\star T$ -преобразованием расслоения**, если оно действует справа

$$u' = ut$$

Мы будем обозначать $\mathcal{E}^\star$ или $p[E]^\star$ множество $\star T$ -невырожденных преобразований расслоения $p[A]$. $\square$

Мы будем обозначать e тождественное преобразование расслоения.

Так как $T\star$ -преобразованием расслоения определено послойно, то множество $\star p[E]$ является расслоением, изоморфным расслоению $p[\star E]$.

Определение 5.6. Пусть на множестве $\star p[A]$ определена структура расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры ([2]). Пусть $p[B]$ является расслоенной $\mathcal{F}$ -алгеброй. Мы будем называть гомоморфизм расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр

$$(5.1) \quad f : p[B] \rightarrow \star p[A]$$

левосторонним представлением или **$T\star$ -представлением расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры $p[B]$** . $\square$

Определение 5.7. Пусть на множестве $p[A]^\star$ определена структура расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры ([2]). Пусть $p[B]$ является расслоенной $\mathcal{F}$ -алгеброй. Мы будем называть гомоморфизм расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр

$$f : p[B] \rightarrow p[A]^\star$$


правосторонним представлением или **$\star T$ -представлением расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры $p[B]$** . $\square$

Мы распространим на теорию расслоенных представлений соглашение, описанное в замечании [3]-2.2.14. Мы можем записать принцип двойственности в следующей форме


Теорема 5.8 (принцип двойственности). *Любое утверждение, справедливое для $T\star$ -представления расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры $p[A]$, будет справедливо для $\star T$ -представления расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры $p[A]$.*

Существует два способа определить $T\star$ -представление $\mathcal{F}$ -алгебры B в расслоении $p[A]$. Мы можем определить $T\star$ -представление в слое, либо определить $T\star$ -представление на множестве $\Gamma(p[A])$. В первом случае представление определяет одно и то же преобразование во всех слоях. Во втором случае картина менее ограничена, однако она не даёт полной картины разнообразия представлений в расслоении. Когда мы рассматриваем представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры, мы сразу оговариваем, что преобразования в разных слоях независимы. Требование непрерывной зависимости преобразования от слоя накладывает дополнительные ограничения на $T\star$ -представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры. В то же время это ограничение позволяет изучать представления расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр, когда в слое определена $\mathcal{F}$ -алгебра, параметры которой (например, структурные константы группы Ли) непрерывно зависят от слоя.

Замечание 5.9. На языке диаграмм определение 5.6 означает следующее.



Отображение F - инъекция. Так как мы ожидаем, что представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры действует в каждом слое, то мы видим, что отображение F - биекция. Не нарушая общности, мы можем положить, что $M = M'$ и отображение F - тождественное отображение. Мы будем говорить, что задано представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры $p[B]$ в расслоении $p[A]$ над множеством M . Поскольку база расслоения известна, то, чтобы не перегружать диаграмму деталями, мы будем описывать представление с помощью диаграммы



□

Определение 5.10. Мы будем называть $T\star$ -представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры $p[B]$ **эффективным**, если отображение (5.1) - изоморфизм расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры $p[B]$ в $\star p[A]$. □

Замечание 5.11. Если $T\star$ -представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры эффективно, мы можем отождествлять элемент расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры с его образом и записывать $T\star$ -преобразование, порождённое элементом $a \in A$, в форме

$$v' = av$$

Если $\star T$ -представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры эффективно, мы можем отождествлять элемент $\mathcal{F}$ -алгебры с его образом и записывать $\star T$ -преобразование, порождённое элементом $a \in A$, в форме

$$v' = va$$

□

Определение 5.12. Мы будем называть $T\star$ -представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры **транзитивным**, если для любых $a, b \in V$ существует такое g , что

$$a = f(g)b$$

Мы будем называть $T\star$ -представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры **однотранзитивным**, если оно транзитивно и эффективно. □

Теорема 5.13. $T\star$ -представление однотранзитивно тогда и только тогда, когда для любых $a, b \in M$ существует одно и только одно $g \in A$ такое, что $a = f(g)b$

Доказательство. Следствие определений 5.10 и 5.12. □

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАССЛОЕННОЙ ГРУППЫ

Определение 6.1. Пусть $p[G] : \mathcal{G} \dashrightarrow M$ и $p'[G'] : \mathcal{G}' \dashrightarrow M'$ - две расслоенные группы. Мы будем называть морфизм расслоений

$$f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$$

гомоморфизмом расслоенных групп, если соответствующее отображение слоёв

$$f_x : G_x \rightarrow G'_{x'}$$

является гомоморфизмом групп. □

Определение 6.2. Пусть $p[G] : \mathcal{G} \dashrightarrow M$ и $p'[G'] : \mathcal{G}' \dashrightarrow M'$ - две расслоенные группы. Мы будем называть морфизм расслоений

$$f : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$$

антигомоморфизмом расслоенных групп, если соответствующее отображение слоёв

$$f_x : G_x \rightarrow G'_{x'}$$

является антигомоморфизмом групп. □

Определение 6.3. Пусть $p[G]$ - расслоенная группа. Мы будем называть отображение

$$(6.1) \quad f : p[G] \rightarrow {}^*p[A]$$

$T\star$ -представлением расслоенной группы $p[G]$ в расслоении $p[A]$, если отображение f удовлетворяет условиям

$$(6.2) \quad f(ab)\mu = f(a)(f(b)\mu)$$

$$(6.3) \quad f(\epsilon) = e$$

□

Определение 6.4. Пусть $p[G]$ - расслоенная группа. Мы будем называть отображение

$$(6.4) \quad f : p[G] \rightarrow p[A]^\star$$

$\star T$ -представлением расслоенной группы $p[G]$ в расслоении $p[A]$, если отображение f удовлетворяет условиям

$$(6.5) \quad \mu f(ab) = (\mu f(a))f(b)$$

$$(6.6) \quad f(\epsilon) = e$$

□

Теорема 6.5. Для любого $a \in p[G]$

$$(6.7) \quad f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$$

Доказательство. На основании (6.2) и (6.3), мы можем записать

$$\mu = e\mu = f(aa^{-1})\mu = f(a)(f(a^{-1})\mu)$$

Это завершает доказательство. □

Согласно определению 6.3 f является представлением расслоенной группы. $\square$

Пример 6.8. Групповая операция на расслоении групп определяет два различных представления на расслоении групп: $T\star$ -сдвиг на расслоении групп, который мы определяем равенством

$$(6.12) \quad b' = a \star b = ab$$

и $\star T$ -сдвиг на расслоении групп, который мы определяем равенством

$$(6.13) \quad b' = b \star a = ba$$

$\square$

Пример 6.9. Пусть $p[GL]$ расслоение над осью вещественных чисел. Задав-шись матрицей A , мы можем определить сечение $a(t) = \exp(tA)$, и это сечение будет порождать соответствующий $T\star$ -сдвиг.

Определение 6.10. Пусть f - представлением расслоенной группы $p[G]$ в рас-слоении $p[A]$. Для любого сечения u расслоения $p[A]$ мы определим его **орбиту представления расслоенной группы** как множество

$$\mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u) = \{v = f(g)u : g \in \Gamma(p[G])\}$$

$\square$

$u \in \mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$, так как $f(e) = e$.

Теорема 6.11. Если

$$(6.14) \quad v \in \mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$$

то

$$\mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u) = \mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v)$$

Доказательство. Из (6.14) следует существование $\mu \in \Gamma(p[G])$ такого, что

$$(6.15) \quad v = f(\mu)u$$

Если $\delta \in \mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v)$, то существует $\nu \in \Gamma(p[G])$ такой, что

$$(6.16) \quad \delta = f(\nu)v$$

Подставив (6.15) в (6.16), мы получим

$$(6.17) \quad \delta = f(\nu)f(\mu)u$$

На основании (6.2) из (6.17) следует, что $\delta \in \mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$. Таким образом,

$$\mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v) \subseteq \mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$$

На основании (6.7) из (6.15) следует, что

$$(6.18) \quad u = f(\mu)^{-1}v = f(\mu^{-1})v$$

Равенство (6.18) означает, что $u \in \mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v)$ и, следовательно,

$$\mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u) \subseteq \mathcal{O}(v, g \in \Gamma(p[G]), f(g)v)$$

Это завершает доказательство. $\square$

Допустим, что определено представление группы G на расслоении

$$p[A] : \mathcal{E} \dashrightarrow M$$

Если мы говорим, что представление транзитивно, то это означает, что орбита точки - это всё многообразие $\mathcal{E}$. В случае представления расслоенной группы $p[G]$ орбита точки является слоем, содержащим эту точку.

Теорема 6.12. *Если определены представление f_1 расслоенной группы $p[G]$ в расслоении $p[A_1]$ и представление f_2 расслоенной группы $p[G]$ в расслоении $p[A_2]$, то мы можем определить **прямое произведение представлений f_1 и f_2 расслоенной группы $p[G]$***

$$\begin{aligned} f &= f_1 \otimes f_2 : p[G] \rightarrow p[A_1] \otimes p[A_2] \\ f(g) &= (f_1(g), f_2(g)) \end{aligned}$$

Доказательство. Чтобы показать, что f является представлением, достаточно показать, что f удовлетворяет определению 6.3.

$$f(e) = (f_1(e), f_2(e)) = (e_1, e_2) = e$$

$$\begin{aligned} f(ab)u &= (f_1(ab)u_1, f_2(ab)u_2) \\ &= (f_1(a)(f_1(b)u_1), f_2(a)(f_2(b)u_2)) \\ &= f(a)(f_1(b)u_1, f_2(b)u_2) \\ &= f(a)(f(b)u) \end{aligned}$$

□

7. ОДНОТРАНЗИТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Определение 7.1. Мы будем называть **ядром неэффективности представления расслоенной группы $p[G]$** множество

$$K_f = \{g \in \Gamma(p[G]) : f(g) = e\}$$

Если $K_f = \{e\}$, мы будем называть представление расслоенной группы G **эффективным**. □

Теорема 7.2. *Ядро неэффективности - это подгруппа расслоенной группы G .*

Доказательство. Доказательство не зависит от типа представления, которое мы используем: ковариантное или контравариантное. Пусть f - ковариантное представление и $f(a_1) = \delta$ и $f(a_2) = \delta$. Тогда

$$\begin{aligned} f(a_1 a_2) &= f(a_1) f(a_2) = \delta \\ f(a^{-1}) &= f^{-1}(a) = \delta \end{aligned}$$

□

Теорема 7.3. *Представление транзитивно тогда и только тогда, когда для любых $a, b \in \Gamma(p[A])$ существует одно и только одно $g \in p[G]$ такое, что $a = f(g)b$*

Доказательство. Утверждение является следствием определений 5.10 и 7.1 и теоремы 7.2. □

Определение 7.4. Мы будем называть расслоение $p[A]$ **однородным расслоением расслоенной группы $p[G]$** , если мы имеем однотранзитивное представление расслоенной группы $p[G]$ на $p[A]$. $\square$

Теорема 7.5. Если мы определим однотранзитивное $T\star$ -представление f расслоенной группы $p[G]$ в расслоении $p[A]$, то мы можем однозначно определить координаты на $p[A]$, пользуясь координатами на расслоенной группе $p[G]$.

Если f - ковариантное однотранзитивное представление, то $f(a)$ эквивалентно левому сдвигу $a\star$ на расслоенной группе $p[G]$. Если f - контравариантное однотранзитивное представление, то $f(a)$ эквивалентно правому сдвигу $\star a$ на расслоенной группе $p[G]$.

Доказательство. Представление расслоенной группы $p[G]$ в расслоении $p[A]$ однотранзитивно тогда и только тогда, когда однотранзитивно представление группы G на слое A_x для любого x . Допустим представление f расслоенной группы $p[G]$ - ковариантное однотранзитивное представление. Пусть u, v - сечения расслоения $p[A]$. Выбрав произвольный x , мы найдём согласно теореме [3]-3.4.5 единственный элемент $g_x \in G$ такой, что

$$u(x) = f(g_x)v(x) = g_x v(x)$$

Таким образом, отображение $x \rightarrow g_x$ является искомым сечением расслоения групп $p[G]$.

Аналогично доказывается утверждение для контравариантного однотранзитивного представления.

Чтобы доказать первое утверждение, мы должны выделить карту на многообразии M , где оба расслоения тривиальны. В этом случае, мы можем представить координаты точки $u \in p[A]$ как упорядоченную пару координат (x, y) , где x - координаты проекции на многообразие M , и y - координаты точки в слое. Мы можем представить координаты точки $a \in p[G]$ как упорядоченную пару координат (x, g) , где x - координаты проекции на многообразие M , и g - координаты точки в группе. Соответственно, координаты сечения расслоения $p[A]$ - это отображение $y : M \rightarrow A$, и координаты сечения расслоения $p[G]$ - это отображение $y : M \rightarrow G$.

Мы выберем сечение $v \in \Gamma(p[A])$ и определим координаты сечения $w \in \Gamma(p[A])$ как координаты $a \in p[G]$ такого, что $w = f(a)v$. Координаты, определённые таким образом, однозначны с точностью до выбора начального сечения $v \in \Gamma(p[A])$, так как действие эффективно. $\square$

Замечание 7.6. Мы будем записывать $T\star$ -ковариантное эффективное представление расслоенной группы $p[G]$ в форме

$$v' = a \star v = av$$

Орбита этого представления имеет вид

$$p[G]v = p[G] \star v$$

$\square$

Замечание 7.7. Мы будем записывать $\star T$ -ковариантное эффективное представление расслоенной группы $p[G]$ в форме

$$v' = v \star a = va$$

Орбита этого представления имеет вид

$$vp[G] = v \star p[G]$$

□


Теорема 7.8. *Левый и правый сдвиги на расслоенной группе $p[G]$ перестановочны.*

Доказательство. Это следствие ассоциативности расслоенной группы $p[G]$

$$(a \star \star b)c = a(cb) = (ac)b = (\star b a \star)c$$

□

Теорема 7.9. *Если мы определили однотранзитивное ковариантное $T\star$ -представление f расслоенной группы $p[G]$ на расслоении $p[A]$, то мы можем однозначно определить однотранзитивное ковариантное $\star T$ -представление h расслоенной группы $p[G]$ на расслоении $p[A]$ такое, что диаграмма*



коммутативна для любых $a, b \in \Gamma(p[G])$.

Доказательство. Предположим, что f - однотранзитивное ковариантное $T\star$ -представление. В каждом слое A_x представление f определяет однотранзитивное ковариантное $T\star$ -представление f_x группы G . Согласно теореме [3]-3.4.10 в слое A_x однозначно определено однотранзитивное ковариантное $\star T$ -представление h_x , перестановочное с представлением f_x . Для сечения $a \in \Gamma(p[G])$ определено сечение

$$h(a) : x \rightarrow h_x(a)$$

Отображение h является гомоморфизмом расслоенных групп. □

Мы будем называть представления f и h **парными представлениями расслоенной группы $p[G]$** .

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Серж Ленг, Алгебра, М. Мир, 1968
- [2] S. Burris, H.P. Sankappanavar, A Course in Universal Algebra, Springer-Verlag (March, 1982),
 eprint <http://www.math.uwaterloo.ca/~snburris/htdocs/ualg.html>
 (The Millennium Edition)
- [3] Александр Клейн, Лекции по линейной алгебре над телом,
 eprint [arXiv:math.GM/0701238](https://arxiv.org/abs/math.GM/0701238) (2007)
- [4] Александр Клейн, Бикольцо матриц,
 eprint [arXiv:math.OA/0612111](https://arxiv.org/abs/math.OA/0612111) (2006)

- [5] П. Кон, Универсальная алгебра, М., Мир, 1968
- [6] C. R. F. Maunder, Algebraic Topology, Dover Publications, Inc, Mineola, New York, 1996
- [7] Ж. Поммаре, Системы уравнений с частными производными и псевдо-группы Ли, М., Мир, 1983
- [8] Н. Бурбаки, Общая топология, основные структуры, перевод с французского Д. А. Райкова, М. Наука, 1968
- [9] Allen Hatcher, Algebraic Topology, Cambridge University Press, 2002

9. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- $\star T$ -сдвиг на расслоении групп 17
- $\star T$ -представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры 13
- $\star T$ -представление расслоенной группы 15
- $\star T$ -преобразование расслоения 13
- $T\star$ -представление расслоенной группы 15
- $T\star$ -представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры 13
- $T\star$ -преобразование расслоения 13
- антигомоморфизм расслоенных групп 15
- арность операции 8
- база отображения 3
- векторное расслоение 10
- гомоморфизм расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр 11
- гомоморфизм расслоенных групп 15
- декартова степень A множества B 3
- декартова степень расслоения 8
- декартово произведение расслоений 5
- декартово произведение расслоенных пространств 5
- изоморфизм расслоенных алгебр 11
- ковариантное $T\star$ -представление расслоенной группы 16
- компактно-открытая топология 3
- контравариантное $T\star$ -представление расслоенной группы 16
- левостороннее представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры 13
- левостороннее преобразование расслоения 13
- левый сдвиг на расслоении групп 17
- лифт отображения 3
- однородное расслоение расслоенной группы 19
- однотранзитивное представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры 14
- операция на расслоении 8
- орбита представления расслоенной группы 17
- парные представления расслоенной группы 20
- правостороннее представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры 13
- преобразование расслоения 12
- приведенное декартово произведение расслоений 7
- приведенное декартово произведение расслоенных пространств 7
- пространство отображений 3
- прямое произведение представлений расслоенной группы 18
- расслоенная $\mathcal{F}$ -алгебра 10
- расслоенная $\mathcal{F}$ -подалгебра 12
- расслоенная группа 10
- расслоенное кольцо 10
- транзитивное представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры 14
- эффективное представление расслоенной $\mathcal{F}$ -алгебры 14
- эффективное $T\star$ -представление расслоенной группы 18
- ядро неэффективности представления расслоенной группы 18

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

$b \star a$	$\star T$ -сдвиг 17	$\odot_{i=1}^n p_i[E_i]$	приведенное декартово произведение расслоений 7
$a \star b$	$T\star$ -сдвиг 17	$\odot_{i=1}^n \mathcal{E}_i$	приведенное декартово произведение расслоенных пространств 7
B^A	декартова степень A множества B 3		
$\mathcal{E}^n$	декартова степень расслоенного пространства 8		
$\mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_n$	декартово произведение расслоенных пространств 5		
e	тождественное преобразование расслоения 13		
$\mathcal{E}_1 \odot \dots \odot \mathcal{E}_n$	приведенное декартово произведение расслоенных пространств 7		
$\mathcal{E}^\star$	множество невырожденных $\star T$ -преобразований расслоения $\mathcal{E}$ 13		
$^\star \mathcal{E}$	множество невырожденных $T\star$ -преобразований расслоения $\mathcal{E}$ 13		
f	гомоморфизм расслоенных $\mathcal{F}$ -алгебр 11		
$f = (f_1, \dots, f_n)$	отображение в декартово произведение 4		
$vp[G]$	орбита ковариантного эффективного $\star T$ -представления расслоенной группы 20		
$p[G]v$	орбита ковариантного эффективного $T\star$ -представления расслоенной группы 19		
$\mathcal{O}(u, g \in \Gamma(p[G]), f(g)u)$	орбита представления расслоенной группы $\mathcal{G}$ 17		
$p[E] : \mathcal{E} \rightarrow M$	расслоение 2		
$p[E]^n$	декартова степень расслоения 8		
$p_1[E_1] \times \dots \times p_n[E_n]$	декартово произведение расслоений 5		
$p_1[E_1] \odot \dots \odot p_n[E_n]$	приведенное декартово произведением расслоений 7		
$p[E]^\star$	множество невырожденных $\star T$ -преобразований расслоения $p[E]$ 13		
$^\star p[E]$	множество невырожденных $T\star$ -преобразований расслоения $p[E]$ 13		
$\Gamma(p[E])$	множество сечений расслоения 3		
$\prod_{i=1}^n p_i[E_i]$	декартово произведение расслоений 5		
$\prod_{i=1}^n \mathcal{E}_i$	декартово произведение расслоенных пространств 5		